

## Tableaux

### 4.1. Etat nutritionnel des adultes (18 ans et plus)

- 4.1.1. Etat nutritionnel des adultes de 18 ans et plus (indice de masse corporelle)
- 4.1.2. Diversité de la nourriture et diversité du régime alimentaire chez la population adulte

### 4.2. Maladies de nature durable, handicaps, limitations d'activité

- 4.2.1. Maladies de nature durable ou handicaps
- 4.2.2. Limitations d'activité

### 4.3. Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête et utilisation des services de santé

- 4.3.1. Maladies ou blessures
- 4.3.2. Utilisation des services de santé
- 4.3.3. Appréciation des soins de santé

### 4.4. Maladies des enfants de moins de 5 ans survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête

### 4.5. Autoévaluation de l'état de santé

### 4.6. Habitudes tabagiques, consommation d'alcool et de drogue

- 4.6.1. Habitudes tabagiques
- 4.6.2. Consommation d'alcool
- 4.6.3. Consommation de drogue

### 4.7. Santé mentale des personnes de 15 ans et plus (détresse psychologique)

### 4.8. Connaissance du Sida et prévalence du Sida

### 4.9. Santé de la reproduction

- 4.9.1. Soins pré-natals
- 4.9.2. Soins post-natals

### 4.10. Couverture assurantielle

## 4. SANTE

## 4.1. Santé et état nutritionnel des adultes (18 ans et plus)

## 4.1.1. Etat nutritionnel des adultes de 18 ans et plus (indice de masse corporelle)

## Tableau 4.1.1.1.

Distribution en pourcentage (%) de la population adulte (18 ans et plus) selon l'Indice de Masse corporelle (IMC) par milieu de résidence.

Indice de Masse Corporelle (IMC)	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Insuffisance pondérale bénigne (IMC <16)	0.6	2.4	2.4	1.9
Insuffisance pondérale modérée (IMC 16-16.9)	1.3	3.3	3.6	3.0
Insuffisance pondérale grave (IMC 17-18.4)	4.3	8.4	10.4	8.6
Normal (IMC 18.5-24.9)	64.5	62.7	68.0	66.1
Surcharge pondérale légère (IMC 25-29.9)	23.1	18.0	13.0	16.4
Obèse (IMC >=30)	6.2	5.3	2.6	4.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1752	2509	7212	11473

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

## Tableau 4.1.1.2.

Moyenne et écart-type de l'Indice de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus) par milieu de résidence.

Indice de Masse Corporelle (IMC)	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Moyenne	23.5	22.5	21.8	22.3
Écart-type	3.9	4.2	3.6	3.9
Echantillon	1752	2509	7212	11473

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.1.3.**

Distribution de la population adulte (18 ans et plus) en pourcentage (%) selon l'indice de Masse corporelle (IMC) par département géographique.

Indice de Masse Corporelle (IMC)	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Insuffisance pondérale bénigne (IMC <16)	1.1	1.7	1.8	4.2	1.3
Insuffisance pondérale modérée (IMC 16-16.9)	1.6	3.4	2.5	4.2	2.9
Insuffisance pondérale grave (IMC 17-18.4)	5.2	12.7	8.9	11.9	7.6
Normal (IMC 18.5-24.9)	64.8	69.8	65.1	65.4	68.2
Surcharge pondérale légère (IMC 25-29.9)	22.0	9.7	17.8	11.0	16.5
Obèse (IMC >=30)	5.3	2.7	4.0	3.3	3.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3306	824	1322	656	1426

**Tableau 4.1.1.3. (suite)**

Indice de Masse Corporelle (IMC)	Département géographique					Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	Nord-Est	
Insuffisance pondérale bénigne (IMC <16)	2.8	2.9	4.8	2.6	1.9	1.9
Insuffisance pondérale modérée (IMC 16-16.9)	4.4	4.4	6.8	3.8	3.0	3.0
Insuffisance pondérale grave (IMC 17-18.4)	14.1	10.8	11.8	15.4	8.6	8.6
Normal (IMC 18.5-24.9)	64.8	69.1	63.7	70.8	66.1	66.1
Surcharge pondérale légère (IMC 25-29.9)	11.0	10.4	9.5	6.5	16.4	16.4
Obèse (IMC >=30)	2.9	2.4	3.4	0.9	4.0	4.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	882	1053	1044	960	11473	11473

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.1.4.**

Moyenne et écart-type de l'Indice de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus) par département géographique.

Indice de Masse Corporelle (IMC)	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Moyenne	23.2	21.3	22.5	21.6	22.5
Ecart-type	3.9	3.5	3.8	4.3	3.8
Echantillon	3306	824	1322	656	1426

Tableau 4.1.1.4. (suite)

Indice de Masse Corporelle (IMC)	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Moyenne	21.2	21.3	21.2	20.8	22.3
Ecart-type	3.7	3.5	3.9	2.9	3.9
Echantillon	882	1053	1044	960	11473

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.1.5.

Distribution de la population adulte (18 ans et plus) en pourcentage (%) selon l'indice de masse corporelle (IMC) par sexe.

Indice de Masse Corporelle (IMC)	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Insuffisance pondérale bénigne (IMC <16)	1.3	2.2	1.9
Insuffisance pondérale modérée (IMC 16-16.9)	2.5	3.1	3.0
Insuffisance pondérale grave (IMC 17-18.4)	8.4	8.6	8.6
Normal (IMC 18.5-24.9)	75.7	63.1	66.1
Surcharge pondérale légère (IMC 25-29.9)	11.1	18.1	16.4
Obèse (IMC >=30)	1.0	4.9	4.0
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2753	8720	11473

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.1.1.6.

Moyenne et écart-type de l'Indice de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus) par sexe.

Indice de Masse Corporelle (IMC)	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Moyenne	21.8	22.5	22.3
Ecart-type	3.1	4.1	3.9
Echantillon	2753	8720	11473

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.1.7.**

Distribution de la population adulte (18 ans et plus) en pourcentage (%) selon l'indice de masse corporelle (IMC) par tranche d'âge.

Indice de Masse Corporelle (IMC)	Tranche d'âge				Ensemble
	18-29 ans	30-39ans	40-49 ans	50-59 ans	
Insuffisance pondérale bénine (IMC <16)	0.8	0.5	1.1	2.5	6.6
Insuffisance pondérale modérée (IMC 16-16.9)	1.7	2.2	2.0	4.6	6.5
Insuffisance pondérale grave (IMC 17-18.4)	8.0	5.5	7.1	9.7	14.1
Normal (IMC 18.5-24.9)	73.0	66.9	63.4	62.5	56.0
Surcharge pondérale légère (IMC 25-29.9)	14.3	19.4	20.5	15.8	13.7
Obèse (IMC >=30)	2.3	5.5	5.9	4.9	3.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3894	2327	1902	1366	11473

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.1.8.**

Moyenne et écart-type de l'indice de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus) par tranche d'âge.

Indice de Masse Corporelle (IMC)	Tranche d'âge				Ensemble
	18- 29 ans	30- 39ans	40- 49 ans	50- 59 ans	
Moyenne	22.1	23.1	23.1	22.3	21.2
Ecart-type	3.3	4.0	4.2	4.2	4.1
Echantillon	3894	2327	1902	1366	11473

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.1.9.**

Distribution de la population adulte (18 ans et plus) en pourcentage (%) selon l'Indice de Masse corporelle (IMC) par quintile du revenu du ménage.

Indice de Masse Corporelle (IMC)	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Insuffisance pondérale bénine (IMC <16)	3.4	3.0	2.0	1.0	0.9	1.9
Insuffisance pondérale modérée (IMC 16-16.9)	4.6	3.5	3.1	2.3	1.9	3.0
Insuffisance pondérale grave (IMC 17-18.4)	11.8	10.7	9.0	8.8	3.9	8.6
Normal (IMC 18.5-24.9)	66.1	68.4	68.7	68.2	60.6	66.1
Surcharge pondérale légère (IMC 25-29.9)	12.1	11.6	14.3	15.8	25.5	16.4
Obèse (IMC >=30)	2.0	2.8	2.9	3.9	7.2	4.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2233	2321	2321	2340	2258	11473

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.1.10.**

Moyenne et écart-type de l'Indice de masse corporelle (IMC) de la population adulte (18 ans et plus) par quintile du revenu total du ménage.

Indice de Masse Corporelle (IMC)	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Moyenne	21.5	21.7	22.0	22.4	23.6	22.3
Ecart-type	3.7	3.8	3.6	3.7	4.1	3.9
Echantillon	2233	2321	2321	2340	2258	11473

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**4.1.2. Diversité de la nourriture chez la population adulte ( 18 ans et plus )**

**Tableau 4.1.2.1.**

Distribution de la population adulte (18 ans et +) en pourcentage (%) selon la diversité de la nourriture par milieu de résidence.

Score de diversité de la nourriture	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Faible: 1-9	11.3	32.1	35.9	28.9
Moyen: 10-14	25.0	27.1	33.0	30.0
Elevé: >=15	63.7	40.8	31.1	41.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1922	2616	7612	12150

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.2.2.**

Moyenne et écart-type du score de diversité de la nourriture chez la population adulte (18 ans et +) par milieu de résidence.

Score de diversité de la nourriture	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Moyenne	18.5	14.0	12.3	14.2
Ecart-type	9.4	7.8	6.3	7.9
Echantillon	1922	2616	7612	12150

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.2.3.**

Distribution de la population adulte (18 ans et plus) en pourcentage (%) selon le score de diversité de la nourriture par département géographique.

Score de diversité de la nourriture	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Faible: 1-9	20.0	19.9	14.4	63.1	48.2
Moyen: 10-14	27.6	34.3	26.9	24.3	32.5
Elevé: >=15	52.4	45.8	58.7	12.6	19.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3536	890	1343	672	1479

**Tableau 4.1.2.3. (suite)**

Score de diversité de la nourriture	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Faible: 1-9	31.9	21.5	46.4	44.3	28.9
Moyen: 10-14	29.9	39.6	31.0	30.4	30.0
Elevé: >=15	38.2	38.9	22.6	25.3	41.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	952	1133	1165	980	12150

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.2.4.**

Moyenne et écart-type du score de diversité de la nourriture chez la population adulte (18 ans et +) par département géographique.

Score de diversité de la nourriture	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Moyenne	16.4	14.7	16.6	9.3	10.5
Ecart-type	8.9	6.6	7.2	5.2	5.4
Echantillon	3536	890	1343	672	1479

**Tableau 4.1.2.4. (suite)**

Score de diversité de la nourriture	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Moyenne	13.7	13.9	10.8	11.2	14.2
Ecart-type	7.9	6.5	5.4	5.9	7.9
Echantillon	952	1133	1165	980	12150

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.2.5.**

Distribution de la population adulte (18 ans et +) en pourcentage (%) selon le score de diversité de la nourriture par quintile du revenu du ménage.

Score de diversité de la nourriture	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Faible: 1-9	54.5	36.3	29.7	21.2	11.4	28.9
Moyen: 10-14	28.9	31.9	34.7	33.9	22.1	30.0
Elevé: >=15	16.6	31.8	35.6	44.9	66.5	41.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2332	2444	2462	2479	2433	12150

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.2.6.**

Moyenne et écart-type du score de diversité de la nourriture chez la population adulte (18 ans et +) en pourcentage (%) par quintile du revenu total du ménage.

Score de diversité de la nourriture	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Moyenne	10.2	12.2	13.2	14.9	18.7	14.2
Ecart-type	6.9	6.3	7.0	7.4	8.5	7.9
Echantillon	2332	2444	2462	2479	2433	12150

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.2.7.**

Distribution de la population adulte (18 ans et +) en pourcentage (%) selon le score de diversité du régime alimentaire par milieu de résidence.

Score de diversité du régime alimentaire	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Faible: 1- 3	14.0	21.0	26.0	22.0
Moyen: 4- 5	38.0	51.0	55.0	50.0
Elevé: >5	48.0	28.0	19.0	28.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1922	2616	7596	12134

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.2.8.**

Moyenne et écart-type du score de diversité du régime alimentaire chez la population adulte (18 ans et +) par milieu de résidence.

Score de diversité du régime alimentaire	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Moyenne	5.4	4.7	4.4	4.7
Ecart-type	1.7	1.5	1.4	1.5
Echantillon	1922	2616	7596	12134

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.2.9.**

Distribution du score de diversité du régime alimentaire chez la population adulte (18 ans et +) en pourcentage (%) par département géographique.

Score de diversité du régime alimentaire	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Faible: 1- 3	18.1	14.6	9.2	49.4	32.8
Moyen: 4- 5	43.2	61.4	58.4	42.7	50.8
Elevé: >5	38.7	24.0	32.4	7.9	16.4
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3532	890	1336	672	1479

**Tableau 4.1.2.9. (suite)**

Score de diversité du régime alimentaire	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Faible: 1- 3	26.6	13.5	29.2	38.3	22.2
Moyen: 4- 5	56.1	59.7	52.9	47.9	49.8
Elevé: >5	17.3	26.8	17.9	13.8	28.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	952	1133	1165	975	12134

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.2.10.**

Moyenne et écart-type du score moyen de diversité du régime alimentaire chez la population adulte (18 ans et +) par département géographique.

Score de diversité du régime alimentaire	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Moyenne	5.1	4.7	5.0	3.7	4.2
Ecart-type	1.6	1.3	1.3	1.3	1.4
Echantillon	3532	890	1336	672	1479

**Tableau 4.1.2.10. (suite)**

Score de diversité du régime alimentaire	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Moyenne	4.4	4.8	4.3	4.1	4.7
Ecart-type	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5
Echantillon	952	1133	1165	975	12134

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.2.11.**

Distribution de la population adulte (18 ans et +) en pourcentage (%) selon le score de diversité du régime alimentaire par quintile du revenu du ménage.

Score de diversité du régime alimentaire	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Faible: 1- 3	40.7	27.2	22.7	17.6	9.0	22.2
Moyen: 4- 5	49.3	56.0	55.8	51.7	39.1	49.8
Elevé: >5	10.0	16.8	21.5	30.7	51.9	28.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2327	2444	2456	2474	2433	12134

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.1.2.12.**

Moyenne et écart-type du score de diversité du régime alimentaire chez la population adulte (18 ans et +) par quintile du revenu total du ménage.

Score de diversité du régime alimentaire	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Moyenne	3.9	4.3	4.6	4.9	5.6	4.7
Ecart-type	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5
Echantillon	2327	2444	2456	2474	2433	12134

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**4.2. Maladies de nature durable, handicaps, limitations d'activité**

**4.2.1. Maladies de nature durable ou handicaps**

**Tableau 4.2.1.1.**

Distribution en pourcentage (%) de la population selon l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap par milieu de résidence.

Existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure, d'un handicap	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Maladie de nature durable	10.7	11.1	9.9	10.3
Maladie et blessure	0.1	0.2	0.1	0.1
Ni l'une ni l'autre	89.1	88.6	89.9	89.5
NSP	0.1	0.1	0.1	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	4468	5408	23001	32877

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) 130 enquêtés n'ont pas répondu à la question sur l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap

**Tableau 4.2.1.2.**

Distribution en pourcentage (%) de la population selon l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap par département géographique.

Existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure, d'un handicap	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Maladie de nature durable	10.3	17.1	15.6	5.9	8.2
Maladie et blessure	-	-	-	-	0.3
Ni l'une ni l'autre	89.6	82.8	84.1	94.1	91.5
NSP	0.1	0.1	0.3	-	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	8399	2558	3750	1938	3917

**Tableau 4.2.1.2. (suite)**

Existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure, d'un handicap	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Maladie de nature durable	9.4	9.7	4.3	11.7	10.3
Maladie et blessure	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
Ni l'une ni l'autre	90.5	90.3	95.6	88.3	89.5
NSP	0.0	-	-	-	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2788	3194	3330	3003	32877

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

130 enquêtés n'ont pas répondu à la question sur l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap.

**Tableau 4.2.1.3.**

Distribution en pourcentage (%) de la population selon l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap par sexe.

Existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure, d'un handicap	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Maladie de nature durable	8.5	11.9	10.3
Maladie et blessure	0.1	0.1	0.1
Ni l'une ni l'autre	91.3	87.9	89.5
NSP	0.1	0.1	0.1
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	15890	16987	32877

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 130 enquêtés n'ont pas répondu à la question sur l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap

**Tableau 4.2.1.4.**

Distribution en pourcentage (%) de la population selon l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap par tranche d'âge.

Existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure, d'un handicap	Tranche d'âge					Ensemble
	0- 14	15- 29	30- 44	45- 59	60 ans et plus	
Maladie de nature durable	3.6	6.4	12.5	19.8	36.8	10.3
Maladie et blessure	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1
Ni l'une ni l'autre	96.3	93.4	87.3	80.1	62.9	89.5
NSP	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	12865	8584	5016	3415	2997	32877

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 130 enquêtés n'ont pas répondu à la question sur l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap.

**Tableau 4.2.1.5.**

Distribution en pourcentage (%) de la population selon l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap par situation d'activité.

Existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure, d'un handicap	Situation d'activité				Ensemble
	Actifs occupés	Chômeurs	Inactifs	Hors population en âge de travailler	
Maladie de nature durable	13.1	12.6	12.1	3.5	10.3
Maladie et blessure	-	0.2	0.1	0.1	0.1
Ni l'une ni l'autre	86.8	87.1	87.8	96.4	89.5
NSP	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	9171	2894	12380	8432	32877

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

130 enquêtés n'ont pas répondu à la question sur l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap

**Tableau 4.2.1.6.**

Distribution en pourcentage (%) de la population selon l'existence d'une maladie de nature durable d'une blessure ou d'un handicap par quintile du revenu total du ménage.

Existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure, d'un handicap	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Maladie de nature durable	11.1	10.9	9.3	11.4	8.9	10.3
Maladie et blessure	0.3		0.1		0.0	0.1
Ni l'une ni l'autre	88.5	89.1	90.5	88.6	91.0	89.5
NSP	0.1	0.0	0.1	-	0.1	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	6375	6724	6712	6835	6231	32877

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

130 enquêtés n'ont pas répondu à la question sur l'existence d'une maladie de nature durable, d'une blessure ou d'un handicap

**Tableau 4.2.1.7.**

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon l'âge d'occurrence de la maladie, de la blessure ou du handicap par milieu de résidence.

Tranche d'âge d'occurrence	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Depuis la naissance	11.8	9.1	8.2	9.2
1 -14 ans	17.8	14.9	15.0	15.6
15- 29	24.7	21.9	16.1	18.9
30- 44	21.1	15.9	17.5	18.1
45- 59	8.0	16.6	18.8	16.0
60 ans et plus	7.9	14.4	16.0	13.9
NSP	8.7	7.2	8.4	8.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	436	584	2204	3224

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

L'information quant à l'âge d'occurrence pour 196 individus n'est pas disponible.

**Tableau 4.2.1.8.**

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon l'âge d'occurrence de la maladie, de la blessure ou du handicap par département géographique.

Tranche d'âge d'occurrence	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Depuis la naissance	10.3	16.0	11.8	6.6	3.8
1 -14 ans	16.9	14.9	19.9	9.4	14.8
15- 29	19.2	20.6	18.3	12.5	22.8
30- 44	21.8	14.3	11.5	14.1	15.7
45- 59	14.2	14.0	11.4	18.2	19.0
60 ans et plus	10.7	14.3	9.6	32.8	10.9
NSP	6.9	5.9	17.5	6.4	13.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	777	418	571	105	316

**Tableau 4.2.1.8.(suite)**

Tranche d'âge d'occurrence	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Depuis la naissance	5.6	6.9	6.7	3.9	9.2
1 -14 ans	19.4	11.0	6.7	10.0	15.6
15- 29	18.6	13.5	19.4	19.3	18.9
30- 44	21.7	21.7	16.7	17.0	18.1
45- 59	15.0	20.7	27.0	23.1	16.0
60 ans et plus	15.3	25.5	17.8	22.5	13.9
NSP	4.4	0.7	5.7	4.2	8.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	256	314	140	327	3224

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) L'information quant à l'âge d'occurrence pour 196 individus n'est pas disponible.

**Tableau 4.2.1.9.**

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon l'âge d'occurrence de la maladie, de la blessure ou du handicap par sexe.

Tranche d'âge d'occurrence	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Depuis la naissance	11.1	7.9	9.2
1 -14 ans	16.6	15.0	15.6
15- 29	17.4	19.9	18.9
30- 44	17.0	18.8	18.1
45- 59	14.2	17.2	16.0
60 ans et plus	15.6	12.8	13.9
NSP	8.1	8.4	8.3
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1321	1903	3224

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
L'information quant à l'âge d'occurrence pour 196 individus n'est pas disponible.

### Tableau 4.2.1.10.

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon l'âge d'occurrence de la maladie, de la blessure ou du handicap par tranche d'âge.

Tranche d'âge d'occurrence	Tranche d'âge					Ensemble
	0- 14	15- 29	30- 44	45- 59	60 ans et plus	
Depuis la naissance	40.3	13.8	6.2	2.6	1.7	9.2
1 -14 ans	58.8	30.7	9.7	5.3	2.7	15.6
15- 29	-	49.8	37.5	11.7	3.9	18.9
30- 44	-	-	38.1	35.1	11.2	18.1
45- 59	-	-	-	33.8	28.2	16.0
60 ans et plus	-	-	-	-	42.3	13.9
NSP	0.9	5.7	8.5	11.5	10.0	8.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	341	509	605	663	1106	3224

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH).

L'information quant à l'âge d'occurrence pour 196 individus n'est pas disponible.

### Tableau 4.2.1.11.

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon la tranche d'âge d'occurrence de la maladie, de la blessure ou du handicap par situation d'activité.

Tranche d'âge d'occurrence	Situation d'activité				Ensemble
	Actifs occupés	Chômeurs	Inactifs	Hors population en âge de travailler	
Depuis la naissance	4.8	7.0	7.1	46.3	9.2
1 -14 ans	6.9	20.2	15.0	53.2	15.6
15- 29	24.2	30.8	14.3	-	18.9
30- 44	26.3	21.9	13.3	-	18.1
45- 59	17.1	13.4	18.6	-	16.0
60 ans et plus	8.7	2.4	24.0	-	13.9
NSP	12.0	4.3	7.7	0.5	8.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1200	369	1434	221	3224

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH).

L'information quant à l'âge d'occurrence pour 196 individus n'est pas disponible.

### Tableau 4.2.1.12.

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon l'âge d'occurrence de la maladie, de la blessure ou du handicap par quintile du revenu total du ménage.

Tranche d'âge d'occurrence	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Depuis la naissance	7.5	8.2	8.9	9.0	12.3	9.2
1 -14 ans	13.0	16.2	13.1	20.4	14.2	15.6
15- 29	18.9	18.4	18.6	18.2	20.9	18.9
30- 44	13.0	15.7	18.1	21.2	21.8	18.1
45- 59	19.2	15.7	17.3	14.5	13.7	16.0
60 ans et plus	19.3	16.9	14.2	9.6	10.4	13.9
NSP	9.1	8.9	9.8	7.1	6.7	8.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	702	705	596	667	554	3224

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH).

L'information quant à l'âge d'occurrence pour 196 individus n'est pas disponible.

**Tableau 4.2.1.13.**

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon la difficulté à se déplacer sans aide par milieu de résidence.

Difficulté à se déplacer sans aide	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Oui, c'est un peu difficile	22.8	31.9	38.0	33.7
Oui, c'est très difficile	15.0	22.2	21.5	20.1
Non	62.0	45.9	40.1	45.9
NSP	0.2	-	0.4	0.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	426	578	2189	3193

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
127 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant leur difficulté à se déplacer

**Tableau 4.2.1.14.**

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon la difficulté à se déplacer sans aide par département géographique.

Difficulté à se déplacer sans aide	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Oui, c'est un peu difficile	25.8	19.2	24.8	52.0	46.6
Oui, c'est très difficile	14.9	27.0	18.1	27.5	28.3
Non	59.2	53.8	56.5	20.5	24.1
NSP	0.2	-	0.6	-	1.0
Total	100.1	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	765	411	574	103	310

**Tableau 4.2.1.14. (suite)**

Difficulté à se déplacer sans aide	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Oui, c'est un peu difficile	39.9	53.4	32.2	63.2	33.7
Oui, c'est très difficile	16.4	22.4	22.3	26.4	20.1
Non	43.7	24.2	45.5	10.1	45.9
NSP	-	-	-	0.3	0.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	254	309	143	324	3193

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
127 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant leur difficulté à se déplacer

**Tableau 4.2.1.16.**

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon la difficulté à se déplacer sans aide par tranche d'âge.

Difficulté à se déplacer sans aide	Tranche d'âge					Ensemble
	0- 14	15- 29	30- 44	45- 59	60 ans et plus	
Oui, c'est un peu difficile	27.2	30.1	32.0	33.1	38.9	33.7
Oui, c'est très difficile	15.3	12.8	15.2	16.3	30.6	20.1
Non	56.7	56.9	52.3	50.3	30.5	45.9
NSP	0.8	0.2	0.5	0.3	-	0.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	317	514	599	664	1099	3193

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

127 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant leur difficulté à se déplacer

**Tableau 4.2.1.17.**

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon la difficulté à se déplacer sans aide par situation d'activité.

Difficulté à se déplacer sans aide	Situation d'activité				Ensemble
	Actifs occupés	Chômeurs	Inactifs	Hors population en âge de travailler	
Oui, c'est un peu difficile	33.8	32.7	34.8	27.5	33.7
Oui, c'est très difficile	14.6	9.3	28.9	13.5	20.1
Non	51.5	57.1	36.3	57.6	45.9
NSP	0.2	0.9	-	1.4	0.3
Total	100.1	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1201	371	1425	196	3193

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

127 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant leur difficulté à se déplacer

**Tableau 4.2.1.18.**

Distribution en pourcentage (%) de la population atteinte d'une maladie de nature durable, blessée ou handicapée selon la difficulté à se déplacer sans aide par quintile du revenu total du ménage.

Difficulté à se déplacer sans aide	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Oui, c'est un peu difficile	36.7	40.6	37.6	26.8	28.0	33.7
Oui, c'est très difficile	25.3	21.4	19.3	16.0	19.3	20.1
Non	36.6	38.0	43.1	57.1	52.7	45.9
NSP	1.4	-	-	0.1	-	0.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	695	696	591	659	552	3193

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

127 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant leur difficulté à se déplacer

**4.2.2. Limitations d'activité**

**Tableau 4.2.2.1.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à monter et descendre les escaliers par milieu de résidence.

Capacité à monter et à descendre les escaliers	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Oui, sans problème	85.9	78.6	74.2	77.6
Oui, avec difficulté	12.4	15.7	18.3	16.5
Non	1.7	5.7	7.2	5.7
NSP	-	-	0.3	0.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	989	1143	4963	7095

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

16 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à monter et à descendre des escaliers

**Tableau 4.2.2.2.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à monter et descendre les escaliers par sexe.

Capacité à monter et à descendre les escaliers	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Oui, sans problème	85.6	70.1	77.6
Oui, avec difficulté	10.4	22.2	16.5
Non	3.9	7.4	5.7
NSP	0.1	0.3	0.2
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3041	4054	7095

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 16 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à monter et à descendre des escaliers

**Tableau 4.2.2.3.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à monter et descendre les escaliers par tranche d'âge.

Capacité à monter et à descendre les escaliers	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Oui, sans problème	92.3	84.3	63.4	28.4	77.6
Oui, avec difficulté	6.5	13.0	30.4	43.5	16.5
Non	1.1	2.6	5.9	27.5	5.7
NSP	0.1	0.1	0.3	0.6	0.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2669	1988	1181	1257	7095

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

16 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à monter et à descendre des escaliers

**Tableau 4.2.2.4.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à monter et descendre les escaliers par situation d'activité.

Capacité à monter et à descendre les escaliers	Situation d'activité			Ensemble
	Actif occupé	Chômeur au sens du BIT	Inactif	
Oui, sans problème	77.9	85.6	74.0	77.6
Oui, avec difficulté	18.4	11.7	16.5	16.5
Non	3.5	2.6	9.3	5.7
NSP	0.2	0.1	0.2	0.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3376	859	2860	7095

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

16 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à monter et à descendre des escaliers

**Tableau 4.2.2.5.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à monter et descendre les escaliers par quintile du revenu total du ménage.

Capacité à monter et à descendre les escaliers	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Oui, sans problème	64.2	74.1	78.7	82.1	84.6	77.6
Oui, avec difficulté	25.1	18.5	15.0	14.0	12.6	16.5
Non	10.3	7.0	6.1	3.9	2.8	5.7
NSP	0.4	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1562	1551	1465	1358	1159	7095

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

16 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à monter et à descendre des escaliers

**Tableau 4.2.2.6.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes par milieu de résidence.

Capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Oui, sans problème	84.2	80.2	75.3	78.1
Oui, avec difficulté	12.4	13.2	16.3	14.9
Non	3.2	6.6	8.4	6.9
NSP	0.2	-	-	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	988	1143	4962	7093

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

18 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes

**Tableau 4.2.2.7.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes par sexe.

Capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Oui, sans problème	85.4	71.4	78.1
Oui, avec difficulté	10.1	19.4	14.9
Non	4.4	9.2	6.9
NSP	0.1	0.0	0.1
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3041	4052	7093

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
18 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes

**Tableau 4.2.2.8.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes par tranche d'âge.

Capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Oui, sans problème	92.7	83.9	65.9	29.1	78.1
Oui, avec difficulté	5.6	13.3	25.1	39.8	14.9
Non	1.7	2.8	9.0	30.7	6.9
NSP	0.0	0.0	-	0.4	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2669	1987	1181	1256	7093

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
18 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes

**Tableau 4.2.2.9.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes par situation d'activité.

Capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes	Situation d'activité			Ensemble
	Actif occupé	Chômeur au sens du BIT	Inactif	
Oui, sans problème	78.7	86.3	74.2	78.1
Oui, avec difficulté	17.0	10.0	14.8	14.9
Non	4.3	3.6	10.8	6.9
NSP	-	0.1	0.2	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3374	859	2860	7093

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
18 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes

**Tableau 4.2.2.10.**

Distribution en pourcentage (%) de la population selon la capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes par quintile du revenu total du ménage.

Capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Oui, sans problème	67.8	75.0	78.1	82.3	84.0	78.1
Oui, avec difficulté	19.5	17.0	14.7	12.4	12.5	14.9
Non	12.7	7.9	7.2	5.0	3.5	6.9
NSP		0.1		0.3		0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1562	1551	1465	1358	1157	7093

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

18 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à marcher rapidement pendant cinq minutes

**Tableau 4.2.2.11.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance par milieu de résidence.

Capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Oui, sans problème	80.0	78.2	73.0	75.4
Oui, avec difficulté	12.7	11.8	15.3	14.2
Non	7.0	10.0	11.6	10.3
NSP	0.3	0.0	0.1	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	988	1143	4959	7090

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) 11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance

**Tableau 4.2.2.12.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance par sexe.

Capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Oui, sans problème	81.7	69.5	75.4
Oui, avec difficulté	10.9	17.3	14.2
Non	7.2	13.1	10.3
NSP	0.2	0.1	0.1
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3040	4050	7090

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance

**Tableau 4.2.2.13.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance par tranche d'âge.

Capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Oui, sans problème	90.6	82.6	61.6	23.7	75.4
Oui, avec difficulté	6.4	11.9	26.3	32.8	14.2
Non	3.0	5.2	11.8	43.3	10.3
NSP	-	0.3	0.3	0.2	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2667	1986	1181	1256	7090

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance

**Tableau 4.2.2.14.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance par situation d'activité.

Capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance	Situation d'activité			Ensemble
	Actif occupé	Chômeur	Inactif	
Oui, sans problème	75.3	83.3	72.4	75.4
Oui, avec difficulté	17.2	10.8	12.4	14.2
Non	7.3	5.6	15.2	10.3
NSP	0.2	0.3	0.0	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3373	858	2859	7090

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance

**Tableau 4.2.2.15.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance par quintile du revenu total du ménage.

Capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Oui, sans problème	64.3	72.8	76.4	79.2	81.1	75.4
Oui, avec difficulté	19.1	15.7	13.3	12.6	11.6	14.2
Non	16.5	11.4	10.3	8.0	7.0	10.3
NSP	0.1	0.1		0.2	0.3	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1561	1551	1463	1358	1157	7090

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à transporter un seau d'eau sur une courte distance

**Tableau 4.2.2.16.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins par milieu de résidence.

Capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Oui, sans problème	84.7	81.1	83.3	83.3
Oui, avec difficulté	6.1	10.9	10.8	9.7
Non	9.2	7.6	5.6	6.7
NSP		0.4	0.3	0.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	988	1143	4959	7090

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins

**Tableau 4.2.2.17.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins par sexe.

Capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Oui, sans problème	85.6	81.2	83.3
Oui, avec difficulté	8.5	10.8	9.7
Non	5.7	7.7	6.7
NSP	0.2	0.3	0.3
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3039	4051	7090

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins

**Tableau 4.2.2.18.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins par tranche d'âge.

Capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Oui, sans problème	90.2	87.8	79.1	55.5	83.3
Oui, avec difficulté	4.5	6.1	13.6	30.4	9.7
Non	5.1	5.7	7.1	13.9	6.7
NSP	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2668	1986	1181	1255	7090

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

11 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur capacité à entendre la conversation entre deux personnes au moins

**4.3. Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête et utilisation des services de santé**

**4.3.1. Maladies ou blessures**

**Tableau 4.3.1.1.**

Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête par milieu de résidence.

Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête	14.5	10.7	11.1	11.8
Echantillon	4476	5432	23099	33007

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.3.1.2.**

Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête par département géographique.

Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête	10.8	15.8	17.9	10.2	4.3
Echantillon	8423	2584	3754	1948	3934

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.3.1.2. (suite)**

Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête	18.9	13.8	13.2	8.9	11.8
Echantillon	2791	3215	3344	3014	33007

Tableau 4.3.1.3.

Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête par sexe.

Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête	10.4	13.1	11.8
Echantillon	15959	17048	33007

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.1.4.

Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête par tranche d'âge.

Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête	Tranche d'âge				
	0- 14 ans	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus
Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête	9.9	9.4	12.6	14.4	23.5
Echantillon	12933	8615	5029	3422	3008
					11.8
					33007

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.1.5.

Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête par niveau d'étude atteint.

Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête	Niveau d'étude atteint				Ensemble
	Aucun niveau	Primaire	Secondaire	Études supérieures	
Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête	13.5	9.9	10.4	10.0	11.8
Echantillon	17347	10905	4538	217	33007

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.3.1.6.**

Proportion la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête par situation d'activité.

Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête	Situation d'activité					Ensemble
	Actifs occupés	Chômeurs	Inactifs	Hors population en âge de travailler		
Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête	12.3	13.1	10.8	12.1	11.8	
Echantillon	9201	2903	12425	8478	33007	

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.3.1.7**

Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête par quintile du revenu total du ménage.

Maladies ou blessures survenues au cours des deux semaines précédant l'enquête	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Proportion de la population ayant été malade ou blessée au cours des deux semaines précédant l'enquête	13.5	12.3	10.1	11.0	12.3	11.8
Echantillon	6332	6546	6743	6845	6541	33007

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.3.1.8.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée selon le type de problème (maladie ou blessure) survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête par milieu de résidence.

Type de problème survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Maladie	95.9	97.9	95.7	96.0
Blessure	4.1	1.8	4.3	4.0
NSP	-	0.3	-	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	638	625	2723	3986

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 27 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de problème de santé

Tableau 4.3.1.9.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée selon le type de problème (maladie ou blessure) survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête par département géographique.

Type de problème survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Maladie	95.5	94.0	97.6	97.6	90.3
Blessure	4.5	6.0	2.4	2.4	9.1
NSP	-	-	-	-	0.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	826	421	670	203	174

Tableau 4.3.1.9. (suite)

Type de problème survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête	Département géographique					Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	Ensemble	
Maladie	97.5	95.6	98.7	95.0	96.0	96.0
Blessure	2.5	4.4	1.3	5.0	4.0	4.0
NSP					0.0	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	516	452	441	283	3986	3986

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

27 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de problème de santé

Tableau 4.3.1.10.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée selon le type de problème (maladie ou blessure) survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête par sexe.

Type de problème survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Maladie	94.7	96.9	96.0
Blessure	5.3	3.0	4.0
NSP	-	0.1	0.0
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1715	2271	3986

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

27 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de problème de santé

**Tableau 4.3.1.11.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée selon le type de problème (maladie ou blessure) survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête par tranche d'âge.

Type de problème survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête	Tranche d'âge					60 ans et plus	Ensemble
	0- 14	15- 29	30- 44	45- 59	60 ans et plus		
Maladie	96.9	94.1	97.7	94.3	96.2	96.0	96.0
Blessure	3.1	5.9	2.3	5.7	3.6	4.0	4.0
NSP	-	-	-	-	0.2	0.0	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1239	820	661	523	743	3986	3986

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

27 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de problème de santé

**Tableau 4.3.1.12.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée selon le type de problème (maladie ou blessure) survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête par situation d'activité.

Type de problème survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête	Situation d'activité				Ensemble
	Actifs occupés	Chômeurs	Inactifs	Hors population en âge de travailler	
Maladie	95.9	93.9	96.0	97.1	96.0
Blessure	4.1	6.1	3.9	2.9	4.0
NSP	-	-	0.1	-	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1258	367	1372	989	3986

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

27 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de problème de santé

**Tableau 4.3.1.13.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée selon le type de problème (maladie ou blessure) survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête par quintile de revenu total du ménage.

Type de problème survenu au cours des deux semaines précédant l'enquête	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Maladie	96.6	94.3	97.0	95.4	96.7	96.0
Blessure	3.2	5.7	3.0	4.6	3.3	4.0
NSP	0.2	-	-	-	-	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	889	874	696	774	753	3986

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

27 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de problème de santé

Tableau 4.3.1.14.

Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées pendant 3 jours au moins par milieu de résidence.

Maladie ou blessure ayant affecté les activités habituelles au moins trois jours	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées	29.8	60.3	69.0	57.1
Echantillon	649	629	2735	4013

IHS/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). Lire : Pour 57.2% de la population malade ou blessée, l'occurrence de la maladie ou de la blessure a eu des incidences sur l'exercice des activités habituelles pendant 3 jours au moins.

Tableau 4.3.1.15

Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées pendant 3 jours au moins par département géographique.

Maladie ou blessure ayant affecté les activités habituelles au moins trois jours	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées	37.9	65.6	59.3	66.5	42.1
Echantillon	838	422	675	204	175

Tableau 4.3.1.15 (suite)

Maladie ou blessure ayant affecté les activités habituelles au moins trois jours	Département géographique			Ensemble
	Centre	Sud	Nord-Ouest	
Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées	78.8	67.1	79.5	57.1
Echantillon	519	452	283	4013

IHS/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) Lire : Pour 57.2% de la population malade ou blessée, l'occurrence de la maladie ou de la blessure a eu des incidences sur l'exercice des activités habituelles pendant 3 jours au moins.

**Tableau 4.3.1.16**

Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées pendant 3 jours au moins par sexe.

Maladie ou blessure ayant affecté les activités habituelles au moins trois jours	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées	58.1	56.3	57.1
Echantillon	1725	2288	4013

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) Lire : Pour 57.2% de la population malade ou blessée, l'occurrence de la maladie ou de la blessure a eu des incidences sur l'exercice des activités habituelles pendant 3 jours au moins.

**Tableau 4.3.1.17**

Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées pendant 3 jours au moins par tranche d'âge.

Maladie ou blessure ayant affecté les activités habituelles au moins trois jours	Tranche d'âge					60 ans et plus	Ensemble
	0- 14 ans	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus		
Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées	55.0	51.3	53.7	59.2	69.7	57.1	57.1
Echantillon	1254	828	662	523	746	4013	4013

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) Lire : Pour 57.2% de la population malade ou blessée, l'occurrence de la maladie ou de la blessure a eu des incidences sur l'exercice des activités habituelles pendant 3 jours au moins.

**Tableau 4.3.1.18.**

Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées pendant 3 jours au moins par situation d'activité.

Maladie ou blessure ayant affecté les activités habituelles au moins trois jours	Situation d'activité				Ensemble
	Actifs occupés	Chômeurs	Inactifs	Hors population en âge de travailler	
Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées	57.9	39.6	64.0	54.9	57.1
Echantillon	1259	372	1383	999	4013

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). Lire : Pour 57.2% de la population malade ou blessée, l'occurrence de la maladie ou de la blessure a eu des incidences sur l'exercice des activités habituelles pendant 3 jours au moins.

**Tableau 4.3.1.19.**

Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées pendant 3 jours au moins par Quintile du revenu total du ménage.

Maladie ou blessure ayant affecté les activités habituelles au moins trois jours	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Proportion de la population malade ou blessée dont les activités habituelles ont été affectées	61.1	64.3	62.1	60.5	42.4	57.1
Echantillon	879	843	708	782	801	4013

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) Lire : Pour 57.2% de la population malade ou blessée, l'occurrence de la maladie ou de la blessure a eu des incidences sur l'exercice des activités habituelles pendant 3 jours au moins.

**Tableau 4.3.1.20.**

Proportion de RSI ayant été affectés par l'une des maladies suivantes au cours des deux semaines précédant l'enquête par milieu de résidence.

Maladie	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Fièvre, malaria	29.2	31.1	34.0	32.5
Diarrhée	0.8	5.0	3.8	3.3
Rhume	11.8	21.3	16.0	15.9
Grippe	18.4	22.8	22.3	21.5
Problèmes au dos	14.5	18.6	28.0	23.6
Autres	56.2	61.2	59.7	59.1
Echantillon	201	270	1157	1628

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). Les pourcentages ne se cumulent pas.

Lire : 29.2% des RSI vivant dans l'Aire Métropolitaine ont eu la fièvre ou la malaria au cours des deux semaines précédant l'enquête

**Tableau 4.3.1.21.**

Proportion de RSI ayant été affectés par l'une des maladies suivantes au cours des deux semaines précédant l'enquête par sexe.

Maladie	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Fièvre, malaria	31.7	33.0	32.5
Diarrhée	2.5	3.9	3.3
Rhume	16.7	15.4	15.9
Grippe	22.3	21.0	21.5
Problèmes au dos	26.4	21.6	23.6
Autres	53.4	63.1	59.1
Echantillon	596	1032	1628

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) Lire : 31.7% des RSI de sexe masculin ont eu la fièvre ou la malaria au cours des deux semaines précédant l'enquête

### Tableau 4.3.1.22.

Proportion de RSI ayant été affectés par l'une des maladies suivantes au cours des deux semaines précédant l'enquête par tranche d'âge.

Maladie	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans ou plus	
Fièvre, malaria	39.5	36.4	24.7	22.7	32.5
Diarrhée	2.7	4.5	2.9	3.5	3.3
Rhume	16.8	16.8	15.4	14.0	15.9
Grippe	22.8	23.0	23.3	16.5	21.5
Problèmes au dos	13.3	20.9	28.0	40.0	23.6
Autres	52.8	58.7	62.3	67.7	59.1
Echantillon	469	401	296	462	1628

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Lire : 39.5% des RSI de 15-29 ans ont eu la fièvre ou la malaria au cours des deux semaines précédant l'enquête.

### Tableau 4.3.1.23.

Proportion de RSI ayant été affectés par l'une des maladies suivantes au cours des deux semaines précédant l'enquête par quintile du revenu total du ménage.

Maladie	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Fièvre, malaria	31.4	35.2	32.6	33.2	30.7	32.5
Diarrhée	3.7	4.2	2.4	4.1	2.5	3.3
Rhume	10.7	18.4	14.8	16.6	18.4	15.9
Grippe	17.7	24.8	19.8	21.0	23.5	21.5
Problèmes au dos	26.1	25.7	17.2	27.5	21.5	23.6
Autres	63.4	55.5	64.2	56.9	56.6	59.1
Echantillon	444	356	286	265	277	1628

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH).

Lire 31.4% des RSI les plus pauvres ont eu la fièvre ou la malaria au cours des deux semaines précédant l'enquête.

## 4.3.2. Utilisation des services de santé

### Tableau 4.3.2.1.

Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé par milieu de résidence.

Consultation d'un personnel de Santé	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé	38.5	63.8	51.0	49.1
Echantillon	649	629	2735	4013

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

### Tableau 4.3.2.2.

Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé par département géographique.

Consultation d'un personnel de Santé	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé	41.6	44.0	56.8	44.0	45.1
Echantillon	838	422	675	204	175

Tableau 4.3.2.2. (suite)

Consultation d'un personnel de Santé	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé	58.7	53.8	52.3	55.2	49.1
Echantillon	519	452	445	283	4013

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.2.3.

Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé par sexe.

Consultation d'un personnel de Santé	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé	48.7	49.4	49.1
Echantillon	1725	2288	4013

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.2.4.

Proportion de la population malade ou blessée en pourcentage (%) ayant consulté un personnel de santé par tranche d'âge.

Consultation d'un personnel de Santé	Tranche d'âge					Ensemble
	0- 14 ans	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé	53.0	42.1	48.2	49.2	51.3	49.1
Echantillon	1254	828	662	523	746	4013

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.3.2.5.

Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé par quintile du revenu total du ménage.

Consultation d'un personnel de Santé	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Proportion de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé	43.9	48.0	50.2	56.3	47.6	49.1
Echantillon	879	843	708	782	801	4013

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.3.2.6.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée n'ayant consulté aucun personnel de santé selon la raison de la non-consultation par milieu de résidence.

Raison de la non-consultation	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Maladie ou blessure sans gravité	44.6	29.8	22.9	30.7
N'aurait pas pu payer le traitement	32.7	45.1	53.3	45.8
Aucun centre de santé de qualité dans la zone		0.4	3.5	2.0
Automédication (soins traditionnels)	12.7	17.7	25.2	20.4
Automédication (achat de médicaments sans ordonnance)	14.0	10.1	7.5	9.9
Trop de travail, trop occupé	1.7	1.1	0.8	1.2
Autres	12.5	13.9	16.3	14.9
NSP	0.5		0.1	0.2
Echantillon	393	215	1310	1918

IHS/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). Question à Réponses Multiples. Le total peut excéder 100. 12 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant les raisons de la non-consultation d'un personnel de santé

**Tableau 4.3.2.7.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée n'ayant consulté aucun personnel de santé selon la raison de la non-consultation par sexe.

Raisons de la non-consultation	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Maladie ou blessure sans gravité	31.6	30.0	30.7
N'aurait pas pu payer le traitement	45.3	46.1	45.8
Aucun centre de santé de qualité dans la zone	2.6	1.6	2.0
Automédication (soins traditionnels)	21.1	19.9	20.4
Automédication (achat de médicaments sans ordonnance)	9.4	10.3	9.9
Trop de travail, trop occupé	0.8	1.4	1.2
Autres	13.9	15.5	14.9
NSP	0.2	0.2	0.2
Echantillon	828	1090	1918

IHS/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). Question à Réponses Multiples. Le total peut excéder 100. 12 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant les raisons de la non-consultation d'un personnel de santé

Tableau 4.3.2.8.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée n'ayant consulté aucun personnel de santé selon la raison de la non-consultation par tranche d'âge.

Raison de la non-consultation	Tranche d'âge				
	0- 14	15- 29	30- 44	45- 59	60 ans et plus
Maladie ou blessure sans gravité	30.1	43.3	27.8	27.6	18.4
N'aurait pas pu payer le traitement	46.9	35.1	44.1	48.1	59.4
Aucun centre de santé de qualité dans la zone	2.1	1.4	1.4	2.6	3.2
Automédication (soins traditionnels)	21.8	15.4	20.6	22.7	23.5
Automédication (achat de médicaments sans ordonnance)	10.0	11.9	9.4	10.1	7.2
Trop de travail, trop occupé	0.7	0.9	1.9	0.6	1.9
Autres	13.3	13.7	16.9	13.9	18.0
NSP	0.3	0.3			0.3
Echantillon	564	431	334	252	337
					1918

IHS/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). Question à Réponses Multiples. Le total peut excéder 100. 12 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant les raisons de la non-consultation d'un personnel de santé.

Tableau 4.3.2.9.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée n'ayant consulté aucun personnel de santé selon la raison de la non-consultation par quintile du revenu total du ménage.

Raisons de la non-consultation	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc				
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)
Maladie ou blessure sans gravité	23.2	19.7	24.0	25.8	54.9
N'aurait pas pu payer le traitement	58.8	55.4	51.0	40.8	25.6
Aucun centre de santé de qualité dans la zone	1.7	5.0	2.7	1.2	0.1
Automédication (soins traditionnels)	20.6	23.4	25.6	24.3	11.3
Automédication (achat de médicaments sans ordonnance)	5.2	6.2	9.2	12.0	16.3
Trop de travail, trop occupé	0.4	2.2	0.4	1.6	1.2
Autres	17.6	15.4	15.5	14.5	11.7
NSP	0.2			0.5	0.3
Echantillon	495	427	334	315	347
					1918

IHS/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). Question à Réponses Multiples. Le total peut excéder 100. 12 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant les raisons de la non-consultation d'un personnel de santé.

**Tableau 4.3.2.10.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de personnel de santé rencontré par milieu de résidence.

Type de personnel de santé rencontré	Milieu de résidence				Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural		
Médecin généraliste, spécialiste	94.8	81.7	62.2	72.4	
Infirmière, Pharmacien	1.9	15.3	27.0	19.7	
Doktè-fèy, Houngan/manbo	1.5	1.6	4.5	3.4	
Parent, voisin	0.6	0.9	1.2	1.0	
Sage-femme, matrone, autres	0.4	0.3	4.6	3.0	
NSP	0.8	0.2	0.5	0.5	
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	
Echantillon	235	400	1373	2008	

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

37 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de personnel de santé rencontré

**Tableau 4.3.2.11.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de personnel de santé rencontré par département géographique.

Type de personnel de santé rencontré	Département géographique						
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite		
Médecin généraliste, spécialiste	86.8	65.2	77.7	94.6	70.9		
Infirmière, Pharmacien	7.5	24.5	14.2	5.4	14.3		
Doktè-fèy, Houngan/manbo	2.7	6.3	2.2		3.7		
Parent, voisin	0.6	0.6	2.8		1.4		
Sage-femme, matrone, autres	1.8	3.4	1.4		9.7		
NSP	0.6		1.7				
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
Echantillon	337	195	383	80	79		

**Tableau 4.3.2.11. (suite)**

Type de personnel de santé rencontré	Département géographique					Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest		
Médecin généraliste, spécialiste	56.0	63.1	62.2	56.6	72.4	
Infirmière, Pharmacien	36.1	34.5	23.9	29.9	19.7	
Doktè-fèy, Houngan/manbo	4.3	1.1	4.3	9.4	3.4	
Parent, voisin	0.6	0.1		2.5	1.0	
Sage-femme, matrone, autres	2.7	1.2	9.6	1.6	3.0	
NSP	0.3				0.5	
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
Echantillon	298	242	235	159	2008	

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

37 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de personnel de santé rencontré

**Tableau 4.3.2.12.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de personnel de santé rencontré par sexe.

Type de personnel de santé rencontré	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Médecin généraliste/ spécialiste	69.6	74.4	72.4
Infirmière/ Pharmacien	21.9	18.1	19.7
Doktè-fèy/ Houngan/manbo	4.0	2.9	3.4
Parent/ voisin	0.8	1.2	1.0
Sage-femme/ Matrone ou autres	3.4	2.7	3.0
NSP	0.3	0.7	0.5
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	862	1146	2008

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
37 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de personnel de santé rencontré

**Tableau 4.3.2.13.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de personnel de santé rencontré par tranche d'âge.

Type de personnel de santé rencontré	Tranche d'âge					Ensemble
	0- 14 ans	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Médecin généraliste/ spécialiste	69.6	70.5	76.5	75.4	73.9	72.4
Infirmière/ Pharmacien	26.3	19.6	14.1	17.0	14.0	19.7
Doktè-fèy/ Houngan/manbo	1.5	5.3	3.7	3.9	4.4	3.4
Parent/ voisin	0.7	0.9	1.2	0.4	1.9	1.0
Sage-femme/ Matrone ou autres	1.9	3.7	3.1	2.9	4.5	3.0
NSP	-	-	1.4	0.4	1.3	0.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	661	376	316	262	393	2008

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
37 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de personnel de santé rencontré

**Tableau 4.3.2.14.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de personnel de santé rencontré par quintile du revenu total du ménage.

Type de personnel de santé rencontré	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Médecin généraliste/ spécialiste	67.2	65.3	71.4	73.4	82.0	72.4
Infirmière/ Pharmacien	18.6	25.0	19.9	21.1	14.5	19.7
Doktè-fèy/ Houngan/manbo	3.4	3.2	6.3	3.7	1.0	3.4
Parent/ voisin	1.5	1.0	0.8	0.5	1.4	1.0
Sage-femme/ Matrone ou autres	9.0	4.8	0.7	1.1	0.5	3.0
NSP	0.3	0.7	0.9	0.2	0.6	0.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	382	427	355	451	393	2008

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
37 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de personnel de santé rencontré

**Tableau 4.3.2.15.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de service de santé par milieu de résidence.

Type de service de santé	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Hôpital privé	44.8	36.3	25.8	31.6
Hôpital public	15.5	31.0	25.3	24.1
Dispensaire/ Centre de santé	17.0	19.1	31.4	26.3
Clinique privée/ Domicile du soignant	19.8	10.8	10.8	12.8
Autre	2.5	2.8	6.5	5.0
NSP	0.4		0.2	0.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	234	402	1366	2002

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

43 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de service de santé utilisé

**Tableau 4.3.2.16.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de service de santé par département géographique.

Type de service de santé	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Hôpital privé	41.5	24.6	42.8	24.4	41.4
Hôpital public	16.5	19.8	28.3	55.4	19.0
Dispensaire/ Centre de santé	19.3	36.2	15.5	14.9	16.7
Clinique privée/ Domicile du soignant	17.9	12.6	9.2	3.8	13.2
Autre	4.5	6.8	3.6	1.5	9.7
NSP	0.3	-	0.6	-	-
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	331	196	384	79	79

**Tableau 4.3.2.16. (suite)**

Type de service de santé	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Hôpital privé	14.2	22.1	19.1	30.0	31.6
Hôpital public	31.0	27.4	24.0	23.3	24.1
Dispensaire/ Centre de santé	45.6	30.4	33.6	31.4	26.3
Clinique privée/ Domicile du soignant	7.4	14.6	13.3	10.4	12.8
Autre	1.8	5.5	10.0	4.9	5.0
NSP	-	-	-	-	0.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	299	242	233	159	2002

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) 43 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de service de santé utilisé

**Tableau 4.3.2.17.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de service de santé par sexe.

Type de service de santé	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Hôpital privé	32.3	31.0	31.6
Hôpital public	23.2	24.8	24.1
Dispensaire/ Centre de santé	28.5	24.7	26.3
Clinique privée/ Domicile du soignant	9.9	14.9	12.8
Autre	5.7	4.6	5.0
NSP	0.4	-	0.2
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	860	1142	2002

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

43 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de service de santé utilisé

**Tableau 4.3.2.18.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de service de santé par tranche d'âge.

Type de service de santé	Tranche d'âge					Ensemble
	0- 14	15- 29	30- 44	45- 59	60 ans et plus	
Hôpital privé	26.2	34.2	37.1	32.5	33.6	31.6
Hôpital public	19.7	25.5	27.1	27.6	26.0	24.1
Dispensaire/ Centre de santé	37.8	23.1	16.2	20.8	20.4	26.3
Clinique privée/ Domicile du soignant	13.1	11.5	13.9	13.1	12.3	12.8
Autre	3.2	5.7	4.8	5.9	7.5	5.0
NSP	-	-	0.8	-	0.3	0.2
Total	100.0	100.0	99.9	99.9	100.1	100.0
Echantillon	658	373	317	262	392	2002

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

43 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant le type de service de santé utilisé

**Tableau 4.3.2.19.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon le type de service de santé par quintile du revenu total du ménage.

Type de service de santé	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Hôpital privé	28.7	29.2	31.7	28.9	38.2	31.6
Hôpital public	24.9	24.3	28.7	26.7	17.5	24.1
Dispensaire/ Centre de santé	24.9	31.6	21.8	34.1	18.6	26.3
Clinique privée/ Domicile du soignant	10.3	9.5	11.4	8.6	22.6	12.8
Autre	10.9	5.1	6.4	1.7	2.7	5.0
NSP	0.3	0.3	-	-	0.4	0.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	382	428	354	446	392	2002

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
43 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant type de service de santé utilisé

**Tableau 4.3.2.20.**

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon la localisation du service de santé par milieu de résidence.

Localisation du service de santé	Milieu de résidence		Ensemble
	Aire Métropolitaine	Rural	
Ville /Quartier /Section communale de résidence	93.0	81.6	81.4
Autre commune	5.8	17.7	17.8
A l'étranger	0.4	0.7	0.5
NSP	0.8	-	0.3
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	229	402	1359

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
55 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant la localisation du service de santé utilisé

Tableau 4.3.2.21.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon la localisation du service de santé par département géographique.

Localisation du service de santé	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Ville /Quartier /Section communale de résidence	91.1	77.3	65.5	70.3	93.9
Autre commune	7.7	20.5	33.5	28.5	6.1
A l'étranger	0.4	1.5	0.7	1.2	
NSP	0.8	0.7	0.3	-	-
Echantillon	327	192	384	78	79

Tableau 4.3.2.21. (suite)

Localisation du service de santé	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Ville /Quartier /Section communale de résidence	89.4	73.8	80.2	83.3	81.4
Autre commune	10.0	26.2	19.4	16.7	17.8
A l'étranger	0.6		0.4		0.5
NSP	-	-	-	-	0.3
Echantillon	298	241	231	160	1990

55 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant la localisation du service de santé utilisé

Tableau 4.3.2.22.

Distribution en pourcentage (%) de la population malade ou blessée ayant consulté un personnel de santé selon la localisation du service de santé par quintile du revenu total du ménage.

Localisation du service de santé	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Ville /Quartier /Section communale de résidence	78.8	76.6	79.3	84.1	86.4	81.4
Autre commune	20.7	23.0	20.0	15.2	12.1	17.8
A l'étranger	-	0.4	0.5	0.8	0.8	0.5
NSP	0.5	-	0.3	-	0.8	0.3
Echantillon	380	427	349	445	389	1990

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

55 enquêtés n'ont pas répondu à la question concernant la localisation du service de santé utilisé

### 4.3.3. Appréciation des soins de santé

**Tableau 4.3.3.1.**

Proportion de RSI malades ou blessés ayant déclaré être très satisfaits ou un peu satisfaits des soins de santé reçus selon le type de service de santé consulté et le milieu de résidence.

Type de service de santé	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Hôpital privé	87.0	91.0	87.4	87.9
Hôpital public	80.9	90.1	87.1	86.9
Dispensaire/ Centre de santé	100.0	87.3	87.8	89.5
Clinique privée/ Domicile du soignant	94.1	83.5	80.8	85.6
Autre	100.0	78.1	86.0	86.8
Echantillon	233	402	1364	1999

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Lire: 87% des enquêtés de l'Aire Métropolitaine ayant utilisé les services d'un hôpital privé se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits

**Tableau 4.3.3.2.**

Proportion de RSI malades ou blessés ayant déclaré être très satisfaits ou un peu satisfaits des soins de santé reçus selon le type de service de santé consulté et le quintile du revenu total du ménage.

Lieu de la consultation	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Hôpital privé	87.5	85.9	88.0	90.0	87.9	87.9
Hôpital public	87.5	85.8	84.4	87.1	89.5	86.9
Dispensaire/ Centre de santé	86.7	92.0	90.7	86.3	92.8	89.5
Clinique privée/ Domicile du soignant	76.4	73.1	83.4	82.9	95.1	85.6
Autre	81.1	100.0	80.5	90.3	92.4	86.8
Echantillon	377	405	361	449	407	1999

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Lire: 92.8% des enquêtés du dernier quintile du revenu total du ménage ayant utilisé les services d'un dispensaire ou d'un centre de santé se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits. 4.4. Maladies des enfants de moins de 5 ans survenues au cours des 2 semaines précédant l'enquête

## 4.4 Maladies des enfants de moins de 5 ans au cours des 2 semaines précédents l'enquête et utilisation des services de santé

**Tableau 4.4.1.**

Proportion d'enfants de moins de 5 ans affectés par l'une des maladies suivantes ou victimes d'un accident au cours des deux semaines précédant l'enquête par milieu de résidence.

Maladie/Accident	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Fièvre	35.9	31.4	33.3	33.5
Toux ou rhume	42.8	38.2	31.8	35.1
Diarrhée	15.2	18.5	14.8	15.6
Accident	0.0	0.6	0.6	0.5
Autres	1.2	5.8	5.4	4.6
Echantillon	407	815	2446	3668

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.4.2.

Proportion d'enfants de moins de 5 ans affectés par l'une des maladies suivantes ou victimes d'un accident au cours des deux semaines précédant l'enquête par département géographique.

Maladie/Accident	Département géographique					Artibonite
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est		
Fièvre	33.3	27.6	32.8	26.3		23.7
Toux ou rhume	38.2	36.1	39.2	27.6		8.1
Diarrhée	14.1	12.3	19.9	10.8		9.5
Accident	0.5	0.3	0.3	0.9		0.3
Autres	1.8	7.6	8.0	7.0		2.1
Echantillon	730	343	401	271		415

Tableau 4.4.2. (suite)

Maladie/Accident	Centre	Département géographique				Ensemble
		Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest		
Fièvre	41.7	38.6	36.0	45.5		33.5
Toux ou rhume	42.5	45.9	35.6	47.8		35.1
Diarrhée	28.0	12.1	16.7	22.2		15.6
Accident	0.5	0.2	1.1	0.6		0.5
Autres	4.8	4.5	8.1	7.4		4.6
Echantillon	384	394	384	346		3668

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.4.3.

Proportion d'enfants de moins de 5 ans affectés par l'une des maladies suivantes ou victimes d'un accident au cours des deux semaines précédant l'enquête par quintile du revenu total du ménage.

Maladie/Accident	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Fièvre	31.7	36.0	33.6	34.3	31.8	33.5
Toux ou rhume	30.7	35.7	35.1	34.0	39.4	35.1
Diarrhée	13.9	18.0	15.2	16.5	14.4	15.6
Accident	0.3	0.4	0.4	0.3	1.0	0.5
Autres	4.9	5.3	6.8	3.3	3.1	4.6
Echantillon	749	780	779	732	628	3668

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.4.4.**

Distribution des enfants de moins de 5 ans en pourcentage (%) tombés malades ou accidentés selon la maladie la plus récente ou l'accident le plus récent survenu(e) au cours des deux semaines précédant l'enquête par milieu de résidence.

Maladie ou accident la/le plus récent/récente	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Fièvre	35.4	24.6	35.8	33.6
Toux ou rhume	45.3	40.5	35.1	38.4
Diarrhée	18.3	28.2	22.1	22.4
Accident	-	0.8	0.2	0.3
Autres	1.0	6.0	6.7	5.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	175	363	1028	1566

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH) L'information concernant la maladie ou l'accident le plus récent d'un des enfants de moins de 5 ans n'existe pas pour 265 cas

**Tableau 4.4.5.**

Distribution des enfants de moins de 5 ans en pourcentage (%) tombés malades ou accidentés selon le type de la maladie la plus récente ou de l'accident le plus récent survenu(e) au cours des deux semaines précédant l'enquête par quintile du revenu total du ménage.

Maladie ou accident la/le plus récent/récente	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Fièvre	39.4	31.6	32.7	34.0	31.6	33.6
Toux ou rhume	34.3	35.1	38.9	38.1	43.7	38.4
Diarrhée	19.9	25.1	21.5	24.3	21.2	22.4
Accident	0.2	0.6	0.3	0.3	0.1	0.3
Autres	6.2	7.6	6.6	3.3	3.4	5.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	299	345	330	318	274	1566

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
L'information concernant la maladie ou l'accident le plus récent d'un des enfants de moins de 5 ans n'existe pas pour 265 cas

**Tableau 4.4.6.**

Proportion d'enfants de moins de 5 ans tombés malades ou accidentés au cours des deux semaines précédant l'enquête et ayant reçu un médicament d'un membre du ménage par milieu de résidence.

Administration de médicaments à un enfant par un membre du ménage	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Proportion d'enfants malades de moins de cinq ans ayant reçu un médicament d'un membre du ménage	58.5	69.8	71.2	68.2
Echantillon	208	428	1195	1831

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.4.7.

Proportion d'enfants de moins de 5 ans tombés malades ou accidentés au cours des deux semaines précédant l'enquête et ayant reçu un médicament d'un membre du ménage par quintile du revenu total du ménage.

	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Administration de médicaments à un enfant par un membre du ménage						
Proportion d'enfants malades de moins de cinq ans ayant reçu un médicament d'un membre du ménage	63.5	70.8	72.1	68.4	65.6	68.2
Echantillon	348	407	388	367	321	1831

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

#### 4.5. Autoévaluation de l'état de santé

Tableau 4.5.1.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon l'autoévaluation de l'état de santé général par milieu de résidence.

Etat de santé général	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Bon / Très bon	48.8	37.4	25.5	32.8
Moyen	40.9	42.8	51.5	47.7
Mauvais	8.8	14.9	16.2	14.3
Très mauvais	1.4	4.8	6.7	5.1
NSP	0.1	0.1	0.1	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	990	1142	4957	7089

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur état de santé général

Tableau 4.5.2.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon l'autoévaluation de l'état de santé général par département géographique.

Etat de santé général	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Bon / Très bon	45.0	19.3	29.8	16.6	20.7
Moyen	42.0	59.5	43.7	46.6	57.5
Mauvais	10.0	17.5	17.8	22.3	14.5
Très mauvais	2.9	3.7	8.5	14.5	7.3
NSP	0.1	-	0.2	-	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1919	559	725	373	895

### Tableau 4.5.2. (suite)

Etat de santé général	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Bon / Très bon	24.1	33.5	20.1	32.5	32.8
Moyen	48.1	47.5	59.2	43.8	47.7
Mauvais	21.9	14.8	16.4	17.1	14.3
Très mauvais	5.9	4.2	4.2	6.6	5.1
NSP	-	-	0.1	-	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	593	675	689	661	7089

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur état de santé général

### Tableau 4.5.3.

Distribution en pourcentage (%) des RSI  
selon l'autoévaluation de l'état de santé général par sexe.

Etat de santé général	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Bon / Très bon	39.4	26.7	32.8
Moyen	45.5	49.7	47.7
Mauvais	10.8	17.5	14.3
Très mauvais	4.2	6.0	5.1
NSP	0.1	0.1	0.1
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3036	4053	7089

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur état de santé général

### Tableau 4.5.4.

Distribution en pourcentage (%) des RSI  
selon l'autoévaluation de l'état de santé général par tranche d'âge.

Etat de santé général	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Bon / Très bon	48.6	29.1	13.7	4.8	32.8
Moyen	43.3	54.1	57.7	41.0	47.7
Mauvais	6.4	13.7	20.9	35.7	14.3
Très mauvais	1.7	2.9	7.7	18.4	5.1
NSP	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2667	1983	1180	1259	7089

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur état de santé général

**Tableau 4.5.5.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI  
selon l'autoévaluation de l'état de santé général par situation d'activité.

Etat de santé général	Situation d'activité			Ensemble
	Actif occupé	Chômeur au sens du BIT	Inactif	
Bon / Très bon	27.2	43.7	34.3	32.8
Moyen	53.0	44.7	43.6	47.7
Mauvais	14.9	9.4	15.5	14.3
Très mauvais	4.9	2.0	6.5	5.1
NSP	0.0	0.2	0.1	0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3372	856	2861	7089

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur état de santé général

**Tableau 4.5.6.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon l'autoévaluation de l'état de santé général  
par quintile du revenu total du ménage.

Etat de santé général	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Bon / Très bon	18.7	23.8	27.9	34.3	52.3	32.8
Moyen	50.3	54.0	51.5	49.6	36.3	47.7
Mauvais	21.6	16.3	15.2	12.4	8.4	14.3
Très mauvais	9.2	5.8	5.4	3.6	3.0	5.1
NSP	0.2	0.1		0.1		0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1559	1550	1464	1358	1158	7089

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur état de santé général

**Tableau 4.5.7**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon l'autoévaluation  
de l'état de santé général par habitude tabagique.

Etat de santé général	Tabagisme			Ensemble
	Oui, chaque jour	Oui, occasionnellement	Jamais	
Bon/ Très bon	20.0	19.5	34.8	32.8
Moyen	46.5	54.1	47.2	47.7
Mauvais	23.7	19.8	13.2	14.3
Très mauvais	9.9	6.5	4.7	5.1
NSP		0.1	0.1	0.1
Total	100.1	100.0	100.0	100.0
Echantillon	537	590	5952	7079

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**4.6 Habitudes tabagiques, consommation d'alcool et de drogues**

**4.6.1. Habitudes tabagiques**

**Tableau 4.6.1.1.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon les habitudes tabagiques par milieu de résidence.

Tabagisme	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Oui, chaque jour	4.0	3.5	7.4	6.0
Oui, occasionnellement	8.5	5.0	7.5	7.4
Jamais	87.5	91.5	85.1	86.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	987	1143	4958	7088

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
13 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude tabagique

**Tableau 4.6.1.2.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon les habitudes tabagiques par département géographique.

Tabagisme	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Oui, chaque jour	4.8	7.8	5.3	4.3	3.8
Oui, occasionnellement	7.9	9.8	3.5	7.9	7.3
Jamais	87.3	82.4	91.2	87.8	88.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1916	560	724	373	898

**Tableau 4.6.1.2.(suite)**

Tabagisme	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Oui, chaque jour	8.2	7.7	10.0	9.5	6.0
Oui, occasionnellement	11.0	6.0	9.0	4.7	7.4
Jamais	80.8	86.3	81.0	85.8	86.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	592	675	689	661	7088

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
13 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude tabagique

**Tableau 4.6.1.3.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon les habitudes tabagiques par sexe.

Tabagisme	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Oui, chaque jour	8.8	3.4	6.0
Oui, occasionnellement	8.8	6.0	7.4
Jamais	82.4	90.6	86.6
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3038	4050	7088

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
13 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude tabagique

Tableau 4.6.1.4.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon les habitudes tabagiques par tranche d'âge.

Tabagisme	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Oui, chaque jour	1.2	5.8	12.6	16.0	6.0
Oui, occasionnellement	4.4	8.6	10.6	12.4	7.4
Jamais	94.4	85.6	76.8	71.6	86.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2668	1983	1180	1257	7088

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

13 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude tabagique

Tableau 4.6.1.5.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon les habitudes tabagiques par niveau d'étude atteint.

Tabagisme	Niveau d'étude atteint			Ensemble
	Aucun niveau	Primaire	Secondaire/ Supérieur	
Oui, chaque jour	10.5	3.7	2.5	6.0
Oui, occasionnellement	10.0	5.7	5.8	7.4
Jamais	79.5	90.6	91.7	86.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3375	2260	1453	7088

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

13 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude tabagique

Tableau 4.6.1.6.

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon les habitudes tabagiques par quintile du revenu total du ménage.

Tabagisme	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Oui, chaque jour	7.2	7.7	5.6	5.0	5.1	6.0
Oui, occasionnellement	8.6	7.3	8.9	7.1	5.6	7.4
Jamais	84.2	85.0	85.5	87.9	89.3	86.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1559	1551	1466	1356	1156	7088

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

13 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude tabagique

**4.6.2. Consommation d'alcool**

**Tableau 4.6.2.1.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la consommation d'alcool par milieu de résidence.

Consommation d'alcool	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Oui, une ou plusieurs fois par semaine	2.9	1.4	4.8	3.9
Oui, occasionnellement	11.5	4.6	7.8	8.2
Non, jamais	85.5	94.0	87.4	87.9
NSP	0.1	-	-	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	988	1142	4961	7091

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
 10 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude quant à la consommation d'alcool

**Tbleau 4.6.2.2.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la consommation d'alcool par département géographique.

Consommation d'alcool	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Oui, une ou plusieurs fois par semaine	3.7	2.8	3.0	1.8	3.8
Oui, occasionnellement	10.4	8.4	4.1	5.5	5.7
Non, jamais	85.8	88.8	92.9	92.7	90.5
NSP	0.1				
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1918	560	724	373	897

**Tbleau 4.6.2.2. (suite)**

Consommation d'alcool	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Oui, une ou plusieurs fois par semaine	4.1	4.2	6.8	4.0	3.9
Oui, occasionnellement	7.8	8.6	8.9	7.8	8.2
Non, jamais	88.1	87.2	84.3	88.2	87.9
NSP	-	-	-	-	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	593	675	690	661	7091

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
 10 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude quant à la consommation d'alcool

**Tableau 4.6.2.3.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la consommation d'alcool par sexe.

Consommation d'alcool	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Oui, une ou plusieurs fois par semaine	6.6	1.3	3.9
Oui, occasionnellement	13.3	3.5	8.2
Non, jamais	80.0	95.2	87.9
NSP	0.1	-	0.0
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3038	4053	7091

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 10 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude quant à la consommation d'alcool

**Tableau 4.6.2.4.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la consommation d'alcool par tranche d'âge.

Consommation d'alcool	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Oui, une ou plusieurs fois par semaine	1.1	4.4	7.7	8.3	3.9
Oui, occasionnellement	6.7	9.1	8.7	11.5	8.2
Non, jamais	92.2	86.5	83.6	80.2	87.9
NSP	0.1	-	-	-	0.0
Total	100.1	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2667	1986	1179	1259	7091

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
10 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude quant à la consommation d'alcool

**Tableau 4.6.2.5.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la consommation d'alcool par niveau d'étude atteint.

Consommation d'alcool	Niveau d'étude atteint			Ensemble
	Aucun niveau	Primaire	Secondaire/ Supérieur	
Oui, une ou plusieurs fois par semaine	6.1	2.8	2.1	3.9
Oui, occasionnellement	8.9	7.3	8.5	8.2
Non, jamais	85.0	89.9	89.3	87.9
NSP	-	-	0.1	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3378	2259	1454	7091

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
10 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude quant à la consommation d'alcool

**Tableau 4.6.2.6.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la consommation d'alcool par quintile du revenu du ménage.

Consommation d'alcool	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Oui, une ou plusieurs fois par semaine	3.5	4.7	4.0	3.6	3.6	3.9
Oui, occasionnellement	6.9	7.3	8.4	8.8	9.1	8.2
Non, jamais	89.6	88.0	87.6	87.6	87.2	87.9
NSP	—	—	—	—	0.1	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1561	1550	1466	1356	1158	7091

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

10 RSI n'ont pas répondu à la question concernant leur habitude quant à la consommation d'alcool

### 4.6.3. Consommation de drogue

**Tableau 4.6.3.1.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la connaissance d'un consommateur de drogue par milieu de résidence.

Connaît un consommateur de drogue	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Oui	6.5	8.2	5.4	6.1
Non	86.6	91.7	94.0	91.9
NSP	6.9	0.1	0.6	2.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	979	1136	4922	7037

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

64 RSI n'ont pas répondu à la question à savoir s'ils connaissaient un consommateur de drogue

**Tableau 4.6.3.2.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la connaissance d'un consommateur de drogue par département géographique.

Connaît un consommateur de drogue	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Oui	6.0	5.1	6.9	0.8	4.9
Non	89.4	94.2	92.5	99.2	95.0
NSP	4.6	0.7	0.6		0.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1902	555	721	367	892

**Tableau 4.6.3.2. (suite)**

Connaît un consommateur de drogue	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Oui	2.0	6.5	12.5	6.7	6.1
Non	97.7	93.3	86.8	93.2	91.9
NSP	0.3	0.2	0.7	0.1	2.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	590	667	688	655	7037

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

64 RSI n'ont pas répondu à la question à savoir s'ils connaissaient un consommateur de drogue

**Tableau 4.6.3.3.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI  
selon la connaissance d'un consommateur de drogue par sexe.

Connaît un consommateur de drogue	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Oui	7.9	4.5	6.1
Non	90.7	93.0	91.9
NSP	1.5	2.5	2.0
Total	100.1	100.0	100.0
Echantillon	3014	4023	7037

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH). 64 RSI n'ont pas répondu à la question à savoir s'ils connaissaient un consommateur de drogue

**Tableau 4.6.3.4.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la connaissance  
d'un consommateur de drogue par tranche d'âge.

Connaît un consommateur de drogue	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Oui	7.8	5.7	4.4	2.6	6.1
Non	90.2	92.3	93.0	96.1	91.9
NSP	2.0	2.0	2.6	1.3	2.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2645	1973	1169	1250	7037

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
64 RSI n'ont pas répondu à la question à savoir s'ils connaissaient un consommateur de drogue

**Tableau 4.6.3.5.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la connaissance  
d'un consommateur de drogue par niveau d'étude atteint.

Connaît un consommateur de drogue	Niveau d'étude atteint			Ensemble
	Aucun niveau	Primaire	Secondaire/Supérieur	
Oui	3.6	7.4	7.9	6.1
Non	95.1	91.3	88.1	91.9
NSP	1.3	1.3	4.0	2.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3350	2242	1445	7037

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
64 RSI n'ont pas répondu à la question à savoir s'ils connaissaient un consommateur de drogue

**Tableau 4.6.3.6.**

Distribution en pourcentage (%) des RSI selon la connaissance  
d'un consommateur de drogue par quintile du revenu total du ménage.

Connaît un consommateur de drogue	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Oui	3.3	5.0	4.7	8.2	8.2	6.1
Non	95.6	92.7	91.8	89.5	90.9	91.9
NSP	1.1	2.3	3.5	2.3	0.9	2.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1544	1544	1458	1345	1146	7037

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
64 RSI n'ont pas répondu à la question à savoir s'ils connaissaient un consommateur de drogue

**4.7. Santé mentale des personnes de 15 ans et plus (détresse psychologique)**

**Tableau 4.7.1.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de la nervosité ressentie par milieu de résidence.

Intensité de la nervosité ressentie	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Forte	10.1	9.8	15.5	13.4
Modérée	26.1	25.9	24.9	25.3
Faible	18.7	11.6	14.6	15.1
Nulle	45.1	52.7	45.0	46.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	983	1142	4955	7080

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

21 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la nervosité ressentie

**Tableau 4.7.2.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de la nervosité ressentie par département géographique.

Intensité de la nervosité ressentie	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Forte	11.6	15.4	16.2	9.2	14.9
Modérée	27.0	12.7	25.5	32.7	30.8
Faible	15.3	10.1	17.6	7.0	13.3
Nulle	46.1	61.8	40.7	51.1	41.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1910	556	726	373	898

**Tableau 4.7.2. (suite)**

Intensité de la nervosité ressentie	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Forte	10.2	13.1	19.2	13.0	13.4
Modérée	26.0	10.1	23.4	33.1	25.3
Faible	20.4	13.2	13.9	21.5	15.1
Nulle	43.4	63.6	43.5	32.4	46.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	593	675	689	660	7080

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

21 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la nervosité ressentie

**Tableau 4.7.3.**

Distribution des RSI en pourcentage (%)  
selon l'intensité de la nervosité ressentie par sexe.

Intensité de la nervosité ressentie	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Forte	11.1	15.5	13.4
Modérée	23.6	27.0	25.3
Faible	14.4	15.7	15.1
Nulle	50.9	41.8	46.2
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3035	4045	7080

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
21 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la nervosité ressentie

**Tableau 4.7.4.**

Distribution des RSI en pourcentage (%)  
selon l'intensité de la nervosité ressentie par tranche d'âge.

Intensité de la nervosité ressentie	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Forte	8.6	13.7	16.7	26.3	13.4
Modérée	21.7	27.4	29.2	30.3	25.3
Faible	13.3	16.8	18.0	15.0	15.1
Nulle	56.4	42.1	36.1	28.4	46.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2665	1982	1177	1256	7080

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
21 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la nervosité ressentie

**Tableau 4.7.5.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de la nervosité ressentie par niveau d'étude atteint.

Intensité de la nervosité ressentie	Niveau d'étude atteint			Ensemble
	Aucun niveau	Primaire	Secondaire/ Supérieur	
Forte	19.5	10.5	8.5	13.4
Modérée	27.7	24.6	23.0	25.3
Faible	15.8	14.5	14.8	15.1
Nulle	37.0	50.4	53.8	46.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3372	2257	1451	7080

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
21 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la nervosité ressentie

### Tableau 4.7.6.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de la nervosité ressentie par quintile du revenu total du ménage.

Intensité de la nervosité ressentie	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Forte	16.1	14.9	15.7	12.0	9.8	13.4
Modérée	30.5	28.0	25.0	24.2	21.0	25.3
Faible	14.4	16.7	14.7	11.8	17.6	15.1
Nulle	39.0	40.4	44.6	52.0	51.6	46.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1561	1550	1460	1355	1154	7080

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
21 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la nervosité ressentie

### Tableau 4.7.7.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité des maux de tête par milieu de résidence.

Intensité des maux de tête	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Forte	18.5	28.7	27.1	25.3
Modérée	31.7	27.4	28.1	28.8
Faible	31.8	18.1	20.4	22.8
Nulle	18.0	25.8	24.4	23.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	989	1142	4958	7089

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité des maux de tête

### Tableau 4.7.8.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité des maux de tête par département géographique.

Intensité des maux de tête	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Forte	19.4	25.6	31.5	33.8	27.1
Modérée	31.0	19.5	30.1	36.1	29.3
Faible	26.5	21.9	20.8	19.8	16.9
Nulle	23.1	33.0	17.6	10.3	26.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1920	556	726	373	898

### Tableau 4.7.8. (suite)

Intensité des maux de tête	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Forte	25.7	27.0	31.7	31.9	25.3
Modérée	27.2	19.4	24.7	37.6	28.8
Faible	24.1	25.0	17.1	21.6	22.8
Nulle	23.0	28.6	26.5	8.9	23.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	592	675	689	660	7089

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité des maux de tête

**Tableau 4.7.9.**

Distribution des en pourcentage (%) RSI  
selon l'intensité des maux de tête par sexe.

Intensité des maux de tête	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Forte	19.2	30.9	25.3
Modérée	28.1	29.5	28.8
Faible	23.7	21.9	22.8
Nulle	29.0	17.7	23.1
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3037	4052	7089

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité des maux de tête

**Tableau 4.7.10.**

Distribution des RSI en pourcentage (%)  
selon l'intensité des maux de tête par tranche d'âge.

Intensité des maux de tête	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Forte	22.5	24.2	29.9	31.6	25.3
Modérée	26.6	31.4	28.6	32.4	28.8
Faible	22.3	24.1	23.4	21.5	22.8
Nulle	28.6	20.3	18.1	14.5	23.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2668	1987	1178	1256	7089

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité des maux de tête

**Tableau 4.7.11.**

Distribution des en pourcentage (%) RSI selon l'intensité  
des maux de tête par niveau d'étude atteint.

Intensité des maux de tête	Niveau d'étude atteint			Ensemble
	Aucun niveau	Primaire	Secondaire/ Supérieur	
Forte	30.5	24.0	19.3	25.3
Modérée	28.7	28.8	29.1	28.8
Faible	21.1	22.7	25.3	22.8
Nulle	19.6	24.5	26.3	23.1
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3374	2260	1455	7089

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité des maux de tête

### Tableau 4.7.12.

Distribution des en pourcentage (%) RSI selon l'intensité des maux de tête par quintile du revenu total du ménage.

Intensité des maux de tête	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Forte	30.5	27.0	25.5	24.1	21.1	25.3
Modérée	30.0	31.6	31.1	25.8	26.9	28.8
Faible	20.8	20.8	20.5	23.6	26.8	22.8
Nulle	18.8	20.6	22.9	26.5	25.2	23.1
Total	100.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1561	1550	1465	1357	1156	7089

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

12 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité des maux de tête

### Tableau 4.7.13.

Distribution des en pourcentage (%) RSI selon l'intensité de la déprime par milieu de résidence.

Intensité de la déprime	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Forte	9.1	13.3	17.8	15.1
Modérée	30.5	25.0	26.4	27.2
Faible	26.5	23.7	21.6	23.1
Nulle	33.9	38.0	34.2	34.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	974	1138	4920	7032

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

69 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la déprime

### Tableau 4.7.14.

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de la déprime par département géographique.

Intensité de la déprime	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Forte	11.6	22.8	19.4	10.6	15.1
Modérée	29.6	15.2	24.2	39.2	31.5
Faible	20.7	17.7	25.6	27.3	22.6
Nulle	38.1	44.3	30.8	22.9	30.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1898	554	725	367	891

### Tableau 4.7.14. (suite)

Intensité de la déprime	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Forte	16.0	16.7	20.1	14.8	15.1
Modérée	20.5	18.5	23.3	35.9	27.2
Faible	31.9	24.4	22.2	28.8	23.1
Nulle	31.6	40.4	34.4	20.5	34.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	584	672	686	655	7032

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

69 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la déprime

**Tableau 4.7.15.**

Distribution des RSI en pourcentage (%)  
selon l'intensité de la déprime par sexe.

Intensité de la déprime	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Forte	11.7	18.2	15.1
Modérée	26.8	27.6	27.2
Faible	21.8	24.2	23.1
Nulle	39.7	30.0	34.6
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3014	4018	7032

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
69 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la déprime

**Tableau 4.7.16.**

Distribution des RSI en pourcentage (%)  
selon l'intensité de la déprime par tranche d'âge.

Intensité de la déprime	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Forte	10.9	15.8	17.5	26.0	15.1
Modérée	24.7	29.1	30.6	28.7	27.2
Faible	19.8	26.3	26.4	25.3	23.1
Nulle	44.6	28.8	25.5	20.0	34.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2651	1971	1165	1245	7032

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
69 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la déprime

**Tableau 4.7.17.**

Distribution des RSI en pourcentage (%)  
selon l'intensité de la déprime par niveau d'étude atteint.

Intensité de la déprime	Niveau d'étude atteint			Ensemble
	Aucun niveau	Primaire	Secondaire/ Supérieur	
Forte	20.6	12.9	10.0	15.1
Modérée	27.9	27.3	26.1	27.2
Faible	24.0	22.4	22.6	23.1
Nulle	27.5	37.4	41.4	34.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3346	2242	1444	7032

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
69 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la déprime

**Tableau 4.7.18.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de la déprime par quintile du revenu total du ménage.

Intensité de la déprime	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Forte	18.1	16.3	16.8	14.3	11.4	15.1
Modérée	32.4	29.5	27.1	26.1	22.7	27.2
Faible	23.1	23.5	23.9	20.1	24.8	23.1
Nulle	26.4	30.7	32.2	39.5	41.1	34.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1555	1541	1452	1342	1142	7032

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
69 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de la déprime

**Tableau 4.7.19.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales par milieu de résidence.

Intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Forte	15.1	16.3	18.5	17.3
Modérée	20.1	19.9	22.3	21.4
Faible	22.6	18.0	17.3	18.7
Nulle	42.2	45.8	41.9	42.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	983	1142	4948	7073

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
28 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales

**Tableau 4.7.20.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales par département géographique.

Intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Forte	15.1	30.5	23.8	26.7	14.2
Modérée	21.7	11.7	18.6	26.5	27.2
Faible	18.9	10.7	20.2	18.6	21.7
Nulle	44.3	47.1	37.4	28.2	36.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1910	553	726	373	898

**Tableau 4.7.20. (suite)**

Intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Forte	15.5	15.4	18.1	14.9	17.3
Modérée	21.5	11.3	20.3	33.2	21.4
Faible	19.7	15.0	15.0	23.3	18.7
Nulle	43.3	58.3	46.6	28.6	42.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	592	675	688	658	7073

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

28 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales

**Tableau 4.7.21.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales par sexe

Intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Forte	11.6	22.7	17.3
Modérée	19.1	23.6	21.4
Faible	19.1	18.3	18.7
Nulle	50.2	35.4	42.6
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3031	4042	7073

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

28 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales

**Tableau 4.7.22.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales par tranche d'âge.

Intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Forte	12.7	19.0	21.4	26.5	17.3
Modérée	19.1	22.5	24.6	24.1	21.4
Faible	16.6	20.4	21.8	19.5	18.7
Nulle	51.6	38.1	32.2	29.9	42.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2663	1986	1175	1249	7073

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

28 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales

**Tableau 4.7.23.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales par niveau d'étude atteint.

Intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales	Niveau d'étude atteint			Ensemble
	Aucun niveau	Primaire	Secondaire/ Supérieur	
Forte	22.6	15	12.9	17.3
Modérée	23.5	20.7	19.4	21.4
Faible	20.2	17.2	18.2	18.7
Nulle	33.7	47.1	49.4	42.6
Total	100	100	100	100
Echantillon	3365	2255	1453	7073

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

28 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales

**Tableau 4.7.24.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales par quintile du revenu total du ménage.

Intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Forte	19.7	18.1	18.8	16.1	15.0	17.3
Modérée	28.2	22.8	20.2	20.2	17.6	21.4
Faible	18.0	20.9	18.7	18.0	18.0	18.7
Nulle	34.1	38.2	42.3	45.7	49.4	42.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1558	1547	1463	1354	1151	7073

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

28 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité de l'émotivité éprouvée devant les choses banales

**Tableau 4.7.25.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment d'inutilité par milieu de résidence.

Intensité du sentiment d'inutilité	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Forte	7.3	10.7	16.8	13.6
Modérée	20.2	19.7	23.7	22.3
Faible	20.2	18.7	18.9	19.1
Nulle	52.3	50.9	40.6	45.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	983	1141	4942	7066

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

35 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment d'inutilité

**Tableau 4.7.26.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment d'inutilité par département géographique.

Intensité du sentiment d'inutilité	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Forte	10.1	16.7	18.4	19.0	17.6
Modérée	22.2	12.5	19.3	23.4	28.1
Faible	17.9	17.8	18.1	13.5	20.7
Nulle	49.8	53.0	44.2	44.1	33.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1910	554	726	372	897

**Tableau 4.7.26. (suite)**

Intensité du sentiment d'inutilité	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Forte	9.6	16.6	13.7	12.8	13.6
Modérée	23.3	15.0	23.4	30.4	22.3
Faible	21.1	22.3	20.8	21.0	19.1
Nulle	46.0	46.1	42.1	35.8	45.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	591	671	688	657	7066

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

35 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment d'inutilité

**Tableau 4.7.27.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment d'inutilité par sexe.

Intensité du sentiment d'inutilité	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Forte	10.5	16.5	13.6
Modérée	20.6	23.8	22.3
Faible	18.8	19.5	19.1
Nulle	50.1	40.2	45.0
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3032	4034	7066

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

35 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment d'inutilité

**Tableau 4.7.28.**

Distribution des RSI en pourcentage (%)  
selon l'intensité du sentiment d'inutilité par tranche d'âge.

Intensité du sentiment d'inutilité	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Forte	9.3	13.9	15.1	27.0	13.6
Modérée	19.6	22.6	27.1	26.1	22.3
Faible	16.3	21.4	23.5	20.2	19.1
Nulle	54.8	42.1	34.3	26.7	45.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	2660	1980	1175	1251	7066

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

35 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment d'inutilité

**Tableau 4.7.29.**

Distribution des RSI en pourcentage (%)  
selon l'intensité du sentiment d'inutilité par niveau d'étude atteint.

Intensité du sentiment d'inutilité	Niveau d'étude atteint			Ensemble
	Aucun niveau	Primaire	Secondaire/ Supérieur	
Forte	20.0	11.7	7.1	13.6
Modérée	25.8	21.8	18.1	22.3
Faible	20.8	19.2	16.7	19.1
Nulle	33.5	47.4	58.2	44.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3363	2250	1453	7066

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

35 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment d'inutilité

**Tableau 4.7.30.**

Distribution des RSI en pourcentage (%)  
selon l'intensité du sentiment d'inutilité par quintile du revenu total du ménage.

Intensité du sentiment d'inutilité	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Forte	17.4	15.1	15.6	12.4	9.3	13.6
Modérée	28.3	25.6	22.1	21.9	16.0	22.3
Faible	20.3	20.7	20.1	18.2	17.2	19.1
Nulle	34.0	38.6	42.2	47.5	57.5	45.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1554	1546	1461	1353	1152	7066

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

35 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment d'inutilité

**Tableau 4.7.31.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété par milieu de résidence.

Intensité du sentiment de peur ou d'anxiété	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Forte	14.6	10.9	13.9	13.6
Modérée	25.4	19.5	21.6	22.2
Faible	29.7	18.8	20.0	22.2
Nulle	30.3	50.8	44.5	42.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	986	1142	4950	7078

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

23 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété

**Tableau 4.7.32.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété par département géographique.

Intensité du sentiment de peur ou d'anxiété	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Forte	13.8	14.2	20.9	13.6	11.9
Modérée	24.2	9.5	18.7	22.5	27.8
Faible	24.4	18.0	22.1	26.9	23.4
Nulle	37.6	58.3	38.3	37.0	36.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1912	555	726	373	898

**Tableau 4.7.32. (suite)**

Intensité du sentiment de peur ou d'anxiété	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Forte	9.6	12.9	13.6	8.6	13.6
Modérée	28.8	8.8	18.8	30.2	22.2
Faible	18.7	22.9	14.2	19.2	22.2
Nulle	42.9	55.4	53.4	42.0	42.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	591	674	689	660	7078

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

23 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété

**Tableau 4.7.33.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété par sexe.

Intensité du sentiment de peur ou d'anxiété	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Forte	10.5	16.6	13.6
Modérée	19.8	24.4	22.2
Faible	22.1	22.2	22.2
Nulle	47.6	36.8	42.0
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3036	4042	7078

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
23 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété

**Tableau 4.7.34.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété par niveau d'étude atteint.

Intensité du sentiment de peur ou d'anxiété	Niveau d'étude atteint			Ensemble
	Aucun niveau	Primaire	Secondaire/ Supérieur	
Forte	17.2	12.5	10.0	13.6
Modérée	24.1	20.9	21.2	22.2
Faible	21.5	22.0	23.2	22.2
Nulle	37.2	44.5	45.7	42.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	3366	2258	1454	7078

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
23 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété

**Tableau 4.7.35.**

Distribution des RSI en pourcentage (%) selon l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété par quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc.

Intensité du sentiment de peur ou d'anxiété	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Forte	14.8	14.7	14.2	13.8	11.5	13.6
Modérée	26.7	22.4	21.2	20.6	21.1	22.2
Faible	21.5	23.7	21.9	18.8	24.6	22.2
Nulle	37.0	39.2	42.7	46.8	42.8	42.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1558	1548	1463	1355	1154	7078

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
23 RSI n'ont pas répondu à la question concernant l'intensité du sentiment de peur ou d'anxiété

4.8. Connaissance du Sida et prévalence du Sida

Tableau 4.8.1.

Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA par milieu de résidence.

Information sur le VIH / Sida	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA	96.0	95.3	90.4	92.4
Echantillon	990	1145	4966	7101

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.2.

Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA par département géographique

Information sur le VIH / Sida	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA	91.5	93.8	95.0	75.4	91.8
Echantillon	1922	560	727	373	899

Tableau 4.8.2. (suite)

Information sur le VIH / Sida	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA	96.1	94.5	90.9	97.5	92.4
Echantillon	593	676	690	661	7101

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

Tableau 4.8.3.

Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA par sexe.

Information sur le VIH / Sida	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA	93.4	91.5	92.4
Echantillon	3043	4058	7101

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.8.4.**

Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA par tranche d'âge.

Information sur le VIH / Sida	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA	95.0	95.0	91.6	79.7	92.4
Echantillon	2672	1989	1181	1259	7101

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.8.5.**

Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA par niveau d'étude.

Information sur le VIH / Sida	Niveau d'étude atteint				Ensemble
	Aucun niveau	Primaire	Secondaire	Etudes supérieures	
Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA	86.5	95.3	97.5	94.0	92.4
Echantillon	3385	2301	1353	62	7101

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.8.6.**

Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA par quintile du revenu total du ménage.

Information sur le VIH / Sida	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Proportion de RSI ayant déjà entendu parler du VIH/SIDA	86.7	90.9	92.7	94.8	95.0	92.4
Echantillon	1548	1512	1468	1362	1211	7101

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.8.7.**

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA par milieu de résidence.

Recours à une protection contre le VIH / Sida	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Proportion de RSI ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA	89.9	79.9	69.3	76.0
Echantillon	952	1089	4458	6499

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.8.8.**

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA par département géographique.

Recours à une protection contre le VIH / Sida	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Proportion de RSI ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA	80.1	65.5	65.4	78.2	70.3
Echantillon	1719	519	692	266	827

**Tableau 4.8.8. (suite)**

Recours à une protection contre le VIH / Sida	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Proportion de RSI ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA	85.0	85.5	78.2	65.6	76.0
Echantillon	574	636	623	643	6499

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.8.9.**

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA par sexe.

Recours à une protection contre le VIH / Sida	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Proportion de RSI ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA	78.6	73.5	76.0
Echantillon	2835	3664	6499

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.8.10.**

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA par tranche d'âge.

Recours à une protection contre le VIH / Sida	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Proportion de RSI ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA	79.8	79.2	71.2	58.9	76.0
Echantillon	2533	1879	1082	1005	6499

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.8.11.**

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA par quintile du revenu du ménage.

Recours à une protection contre le VIH / Sida	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Proportion de RSI ayant eu recours à une protection contre le VIH/SIDA	67.9	72.2	75.4	76.6	83.4	76.0
Echantillon	1301	1384	1356	1294	1164	6499

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.8.12.**

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant fait le test de dépistage du VIH par milieu de résidence.

	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Proportion de RSI ayant fait le test de dépistage du VIH	10.2	6.7	2.3	4.9
Echantillon	952	1089	4458	6499

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.8.13.**

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant fait le test de dépistage du VIH par département géographique.

	Département géographique				
	Ouest	Sud-Est	Nord	Nord-Est	Artibonite
Proportion de RSI ayant fait le test de dépistage du VIH	7.7	2.4	6.0	1.3	2.3
Echantillon	1719	519	692	266	827

**Tableau 4.8.13. (suite)**

	Département géographique				Ensemble
	Centre	Sud	Grande-Anse	Nord-Ouest	
Proportion de RSI ayant fait le test de dépistage du VIH	1.6	2.8	2.4	4.9	4.9
Echantillon	574	636	623	643	4023

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.8.14.**

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA  
et ayant fait le test de dépistage du VIH par sexe.

	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Proportion de RSI ayant fait le test de dépistage du VIH	4.5	5.3	4.9
Echantillon	2835	3664	6499

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.8.15.**

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA  
et ayant fait le test de dépistage du VIH par tranche d'âge.

	Tranche d'âge				Ensemble
	15- 29 ans	30- 44 ans	45- 59 ans	60 ans et plus	
Proportion de RSI ayant fait le test de dépistage du VIH	4.6	7.2	4.1	2.3	4.9
Echantillon	2533	1879	1082	1005	6499

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.8.16.**

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA  
et ayant fait le test de dépistage du VIH par niveau d'étude atteint.

	Niveau d'étude atteint				Ensemble
	Aucun niveau	Primaire	Secondaire	Etudes supérieures	
Proportion de RSI ayant fait le test de dépistage du VIH	1.6	3.9	9.4	36.1	4.9
Echantillon	2926	2193	1320	60	6499

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.8.17.**

Proportion de RSI ayant entendu parler du VIH/SIDA et ayant fait le test de dépistage  
du VIH par quintile du revenu total du ménage.

	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Proportion de RSI ayant fait le test de dépistage du VIH	2.1	2.2	3.9	3.4	10.6	4.9
Echantillon	1301	1384	1356	1294	1164	6499

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

4.9. Santé de la reproduction.

4.9.1. Soins pré-natals

Tableau 4.9.1.1.

Distribution des naissances vivantes des 5 années précédant l'enquête en pourcentage (%) selon le personnel de santé consulté par la mère au cours de la grossesse par milieu de résidence.

Personnel de santé consulté	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Médecin	67.2	48.0	42.6	50.3
Infirmière	27.2	41.5	39.2	36.3
Sage-femme, matrone ou autre	0.6	2.3	7.3	4.6
Non	5.0	8.2	10.9	8.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	510	682	1920	3112

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
493 des mères concernées n'ont pas répondu quant au personnel de santé consulté

Tableau 4.9.1.2.

Distribution des naissances vivantes des 5 années précédant l'enquête en pourcentage (%) selon le personnel de santé consulté par la mère au cours de la grossesse par quintile du revenu total du ménage du ménage.

Personnel de santé consulté	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Médecin	42.6	46.0	45.5	52.2	60.2	50.3
Infirmière	37.6	38.1	39.9	35.5	32.0	36.3
Sage-femme, matrone ou autre	5.9	5.0	6.0	5.5	1.8	4.6
Non	13.9	10.9	8.6	6.8	6.0	8.8
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	594	621	630	649	618	3112

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)  
493 des mères concernées n'ont pas répondu quant au personnel de santé consulté

Tableau 4.9.1.3.

Proportion de femmes ayant reçu des soins pré-natals (au cours des 5 dernières années précédant l'enquête) selon le type de service de santé consulté par milieu de résidence.

Type de service de santé	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Centre de santé	50.0	34.0	28.3	34.0
Clinique communautaire	3.4	24.3	28.1	22.0
Hôpital public	22.1	29.4	30.5	28.5
Hôpital privé	24.3	16.7	10.3	14.3
Clinique privée	4.4	2.7	1.7	2.4
Clinique spécialisée	0.8	1.0	0.3	0.5
A la maison	1.1	4.1	10.6	7.6
Autres	0.3	0.5	1.5	1.1
Echantillon	355	529	1503	2387

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH).  
Question à réponses multiples. Le total peut excéder 100.

**Tableau 4.9.1.4.**

Proportion de femmes ayant reçu des soins pré-natals (au cours des 5 dernières années précédant l'enquête) selon le type de service de santé consulté par quintile du revenu total du ménage.

Type de service de santé	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Centre de santé	27.9	35.0	36.5	33.2	36.0	34.0
Clinique communautaire	25.5	28.9	26.7	21.5	10.6	22.0
Hôpital public	32.6	27.5	29.1	28.1	26.0	28.5
Hôpital privé	8.5	9.1	9.6	13.5	27.1	14.3
Clinique privée	2.5	1.6	0.9	0.9	5.8	2.4
Clinique spécialisée	0.9	0.6	0.3	0.3	0.6	0.5
A la maison	8.6	9.0	8.9	9.1	3.4	7.6
Autres	3.0	1.2	0.7	0.6	0.5	1.1
Echantillon	449	483	489	497	469	2387

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH).  
Question à réponses multiples. Le total peut excéder 100.

**Tableau 4.9.1.5.**

Distribution des naissances vivantes selon les raisons de l'absence de soins pré-natals au cours de la grossesse par milieu de résidence.

Raison de l'absence de soins pré-natals	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Trop cher	49.4	41.1	40.0	41.3
Pas besoin	37.7	35.2	22.0	25.3
Trop loin	-	-	12.6	9.8
Autres	12.9	23.8	25.3	23.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	32	82	298	412

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.9.1.6.**

Distribution des naissances vivantes selon les raisons de l'absence de soins pré-natals au cours de la grossesse par quintile du revenu total du ménage du ménage.

Raison de l'absence de soins pré-natals	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Trop cher	53.5	35.2	38.8	36.9	38.0	41.3
Pas besoin	16.8	22.0	31.1	30.8	31.8	25.3
Trop loin	10.9	12.7	13.0	3.2	6.0	9.8
Autres	18.8	30.1	17.1	29.1	24.1	23.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	111	101	83	73	44	412

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**4.9.2. Soins post-natals**

**Tableau 4.9.2.1.**

Distribution des femmes de 14 ans et plus en pourcentage (%) selon le résultat de la dernière grossesse par milieu de résidence.

Résultat de la dernière grossesse	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Accouchement - enfant en vie	98.0	97.3	98.4	98.1
Enfant mort - né	0.7	1.1	1.0	1.0
Fausse couche / avortement	1.3	1.6	0.6	0.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	345	532	1566	2443

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.9.2.2.**

Distribution des femmes de 14 ans et plus en pourcentage (%) selon le résultat de la dernière grossesse par quintile du revenu total du ménage.

Résultat de la dernière grossesse	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Accouchement - enfant en vie	97.6	98.5	99.0	97.6	98.1	98.1
Enfant mort - né	1.9	0.4	0.7	1.3	0.5	1.0
Fausse couche / avortement	0.5	1.1	0.3	1.1	1.4	0.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	498	503	492	490	460	2443

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.9.2.3.**

Distribution des femmes de 14 ans et plus en pourcentage (%) selon le résultat de la dernière grossesse par type de personnel de santé consulté pour les soins pré-natals.

Résultat de la dernière grossesse	Personnel de santé consulté				Ensemble
	Médecin	Infirmière	Sage-femme, matrone, autre	Aucun	
Accouchement - enfant en vie	97.9	98.7	98.7	97.3	98.1
Enfant mort - né	1.1	0.8	0.8	1.0	1.0
Fausse couche / avortement	1.0	0.5	0.5	1.7	0.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	1349	667	136	289	2441

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.9.2.4.**

Distribution des naissances vivantes des 5 années précédant l'enquête en pourcentage (%) selon le personnel de santé consulté par la mère au cours de la grossesse pour les soins post-natals (40 jours après l'accouchement) par milieu de résidence.

Personnel de santé consulté 40 jours après l'accouchement	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Médecin	53.1	39.9	27.6	34.7
Infirmière	4.4	18.5	15.2	13.2
Sage-femme, matrone, autre	1.0	2.0	5.6	4.1
Aucun	41.5	39.6	51.6	48.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	341	513	1541	2395

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.9.2.5.**

Distribution des naissances vivantes des 5 années précédant l'enquête en pourcentage (%) selon le personnel de santé consulté par la mère au cours de la grossesse pour les soins post-natals (40 jours après l'accouchement) par quintile du revenu total du ménage du ménage.

Personnel de santé consulté 40 jours après l'accouchement	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Médecin	25.3	27.2	32.1	37.6	47.9	34.7
Infirmière	16.0	14.3	15.4	13.5	7.9	13.2
Sage-femme, matrone, autre	4.6	4.4	4.1	5.5	2.2	4.1
Aucun	54.1	54.1	48.4	43.3	42.0	48.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	487	492	488	479	449	2395

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.9.2.6.**

Distribution des naissances vivantes des 5 années précédant l'enquête selon les raisons de l'absence de soins post-natals par milieu de résidence.

Raison de l'absence de soins post-natals	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Trop cher	30.3	34.0	39.7	37.3
Opposition du mari	58.6	56.2	47.9	50.8
Manque de confiance	11.1	9.8	12.5	11.9
Total	100	100.0	100.0	100.0
Echantillon	131	228	811	1170

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.9.2.7.**

Distribution des naissances vivantes des 5 années précédant l'enquête selon les raisons de l'absence de soins post-natals par quintile du revenu total du ménage. En pourcentage (%) des naissances vivantes sans soins post-natals.

Raison de l'absence de soins post-natals	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Trop cher	48.6	41.4	44.0	27.8	23.4	37.3
Opposition du mari	39.1	43.4	45.6	62.6	64.6	50.8
Manque de confiance	12.2	15.2	10.4	9.6	12.0	11.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	264	274	242	210	180	1170

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

### 4.10. Couverture assurantielle

**Tableau 4.10.1.**

Taux de couverture en pourcentage (%) en assurance-santé de la population par milieu de résidence.

	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Taux de couverture en assurance-santé	7.0	2.8	1.7	3.1
Echantillon	4476	5432	23099	33007

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.10.2.**

Taux de couverture en pourcentage (%) en assurance-santé de la population par sexe.

	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Taux de couverture en assurance-santé	3.1	3.0	3.1
Echantillon	15959	17048	33007

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.10.3.**

Taux de couverture en pourcentage (%) en assurance-santé de la population par situation d'activité.

	Situation d'activité				Ensemble
	Actif occupé	Chômeur	Inactif	Hors population en âge de travailler	
Taux de couverture en assurance-santé	4.5	3.2	2.6	2.1	3.1
Echantillon	9201	2903	12425	8478	33007

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.10.4.**

Taux de couverture en pourcentage (%) en assurance-santé de la population par quintile du revenu total du ménage.

	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Taux de couverture en assurance-santé	1.7	2.5	1.9	2.4	6.2	3.1
Echantillon	6397	6747	6742	6864	6257	33007

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.10.5.**

Distribution de la population disposant d'une assurance-santé en pourcentage (%) selon le type d'assurance par milieu de résidence.

Type d'assurance	Milieu de résidence			Ensemble
	Aire Métropolitaine	Autre urbain	Rural	
Assurance privée	49.5	25.1	10.6	32.5
Assurance liée à l'emploi	38.3	56.1	79.1	55.2
Les deux types d'assurance	12.3	18.8	10.4	12.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	301	144	366	811

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.10.6.**

Distribution de la population disposant d'une assurance-santé en pourcentage (%) selon le type d'assurance par sexe.

Type d'assurance	Sexe		Ensemble
	Homme	Femme	
Assurance privée	33.9	31.1	32.5
Assurance liée à l'emploi	53.7	56.7	55.2
Les deux types d'assurance	12.4	12.3	12.3
Total	100.0	100.0	100.0
Echantillon	409	402	811

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.10.7.**

Distribution de la population disposant d'une assurance-santé en pourcentage (%) selon le type d'assurance par situation d'activité.

Type d'assurance	Situation d'activité				Ensemble
	Actif occupé	Chômeur	Inactif	Hors population en âge de travailler	
Assurance privée	37.6	24.5	26.4	36.5	32.5
Assurance liée à l'emploi	48.3	64.1	65.5	47.1	55.2
Les deux types d'assurance	14.1	11.4	8.2	16.3	12.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	324	87	255	145	811

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

**Tableau 4.10.8.**

Distribution de la population disposant d'une assurance-santé en pourcentage (%) selon le type d'assurance par quintile de revenu du ménage.

Type d'assurance	Quintile du revenu total du ménage avec autoconsommation et troc					Ensemble
	Q1 (20% les plus faibles)	Q2	Q3	Q4	Q5 (20% les plus élevés)	
Assurance privée	3.7	22.1	10.3	25.6	50.5	32.5
Assurance liée à l'emploi	90.9	65.6	78.8	55.2	37.9	55.2
Les deux types d'assurance	5.4	12.2	10.9	19.3	11.6	12.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Echantillon	95	129	104	143	340	811

IHSI/Enquête sur les Conditions de Vie en Haïti (ECVH)

